35 коп.

472-8
СНА

М. СКОПЕЦ

СПОРТИВНОЕ **рыболовство** НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР







Мальма (серебрянка и в брачном наряде)

М. СКОПЕЦ

СПОРТИВНОЕ рыболовство НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР

42479-17
Хасынская ЦБС
Магаданская обл.

Магаданское
книжное
издательство
1990

ББК 47.2
С 44

Редактор Л. А. Савельева

Обложка А. Ю. Коренюхина
Рисунки по тексту
А. Ю. Коренюхина и Ю. А. Коровкина

С $\frac{4002020000-038}{М-149(03)-90}$ 25—90

ISBN 5—7581—0106—0

© Магаданское книжное издательство, 1990

Рыболова-любителя, впервые приехавшего в Магаданскую область или на Камчатку, поражает здесь обилие рыбы: многочисленные стада горбуши и кеты, нерки и кижуча в урожайные годы буквально забивают реки, ручьи и озера. Например, не редкость увидеть по одной-две горбуши на каждом квадратном метре довольно большой реки. Удивительным для него покажется и то, что из моря лососи заходят серебристыми, упитанными, но довольно скоро лошают — худеют, тело их приобретает яркую раскраску, на челюстях самцов вырастают большие зубы. Разбившись на пары, рыбы роют ямки (гнезда) в гальке, откладывают туда икру, засыпают ямки и... умирают. После окончания нереста берега рек завалены дохлой рыбой — сненкой, даже вода, бывает, приобретает неприятный привкус. Необычны внешний вид и повадки других здешних рыб — сигов, гольцов и хариусов. А вот щука, налим и окунь встречаются реже и далеко не везде.

Общаясь с местными рыболовами, приезжий вскоре узнает, что на Северо-Востоке не требуется такое разнообразие снастей и способов лова, как в европейской части СССР. Здесь не встретишь такую идиллическую картину, когда рыбак сидит на берегу, забросив несколько удочек, и, подбрасывая прикормку,

ждет клева. Донками и закидушками пользуются редко (в основном для налима), а кружки и зимние жерлицы можно встретить только на витрине магазина «Спорттовары». У нас в почете активные способы лова: проводка, ходовая донка, блеснение, часто используются мушки и другие искусственные приманки. Устройство снастей зачастую резко отличается от применяемых на материке. Взять хотя бы магаданскую удочку для подледной ловли корюшки: леска длиной не менее 25 метров, легкая блесна в виде загнутой иглы из латуни или мельхиора (крючок без бородки), а выше блесны закреплено грузило весом 20—40 граммов.

Новичок быстро усваивает «поверья» и легенды местных рыболовов, часто довольно далекие от истины,— про живущую в ручьях горную форель, про зубастую рыбу топь и т. д.

К сожалению, популярных книг о рыбах Северо-Востока и их спортивной и любительской ловле практически нет. Неплохая книга В. М. Малинина «Спортивное рыболовство в Магаданской области» вышла более 20 лет назад и во многих отношениях уже устарела, особенно сильно с того времени изменились правила рыболовства. К тому же в этой книге мало данных о самих рыбах, а некоторые из приводимых сведений спорные или просто неправильные.

В предлагаемой вниманию читателя книге автору хотелось отразить своеобразие образа жизни обитающих на Северо-Востоке СССР пресноводных рыб, рассказать о некоторых приемах и тонкостях их лова, об используемых снастях. Большое внимание уделено правилам спортивного и любительского рыболовства в регионе, мерам по охране рыбных богатств. В книге описаны только рыбы, которые хорошо ловятся на спортивные снасти. Запрещенных для любительского лова рыб автор не касался, за исключением очень перспективных для лицензионного лова нельмы и камчатской семги. В книге нет сведений о морских, не заходящих в пресную воду рыбах и вообще о морском рыболовстве, за исключением подледной ловли корюшки.

Книга предназначена для тех, кто уже имеет некоторый опыт спортивного рыболовства. Поэтому рыболов-новичок может не найти здесь ответов на многие элементарные вопросы типа: как правильно намотать леску на шпулю безынерционной катушки? как должна двигаться мормышка? и т. д. Для изучения этой азбуки, без которой нельзя грамотно ловить рыбу, нужно обратиться к другим источникам.

Автор благодарит всех, кто делился с ним своими наблюдениями, сведениями о повадках рыб, показывал снасти. Без этих бескорыстных помощников книга была бы менее полной.

Часть 1

РЫБЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА

Большинство обитающих в пресных водах Магаданской и Камчатской областей видов рыб относится к семейству лососевидных. Важным отличительным признаком его (вместе с близким ему семейством корюшковых) является наличие так называемого жирового плавника — второго спинного плавника в виде кожного выроста без костных лучей. Лососевидных делят на три подсемейства: лососевых, хариусовых и сиговых.

Подсемейство лососевых. Лососевые — крупные или средней величины рыбы. Для них характерна мелкая чешуя, большая пасть с хорошо развитыми зубами, питание хищное или же смешанное, то есть в рацион наряду с мелкой рыбой входят и беспозвоночные. Молодь лососевых (кроме горбуши) имеет специфическую мальковую окраску в виде темных поперечных полос. На территории Магаданской и Камчатской областей встречаются представители четырех родов лососевых: тихоокеанские лососи, тихоокеанские благородные лососи, гольцы и ленки.

Подсемейство хариусовых. Для хариусов характерен средних размеров рот с небольшими зубами, крупная чешуя и большой спинной плавник, в котором не менее 17 лучей (у лососевых — до 16). У нас встречается только один вид — сибирский хариус — с тремя подвидами.

Подсемейство сиговых. Сиговые отличаются от лососевых небольшим ртом без зубов (крошечные зубы есть у нельмы) и крупной серебристой чешуей. Одни виды сигов постоянно обитают в пресной воде (валек, чир и пелядь), другие являются полупроходными и нагуливаются в приустьевой части рек, в солоноватой воде. В отличие от настоящих проходных рыб (лососевых) сиговые не выходят в воду океанической солености.

Представители рода **тихоокеанских лососей** обитают в северной части Тихого океана, они нагуливаются в открытом море, а для размножения заходят в пресную воду. В отличие от других лососевых эти рыбы всегда гибнут после первого нереста. Выклюнувшиеся из икры мальки скатываются в море — обычно на несколько лет. Тихоокеанским лососям (кроме горбуши) свойственно возвращаться для нереста в родную реку. Это явление называется хоминг. Некоторые виды (кижуч, нерка) могут образовывать в озерах жилые (не уходящие в море) стада. Жилые лососи всегда мельче проходных.

В море все виды тихоокеанских лососей похожи. Но после захода в пресную воду у них развивается брачный наряд, по которому их проще всего различить. Брачный наряд сильнее выражен у самцов: разрастаются челюстные кости, появляются крупные зубы и яркая окраска сменяет серебристую, а на спине вырастает горб. У самок форма тела почти не изменяется, но увеличиваются зубы, на теле и голове рыб также появляется яр-



Горбуша

кая окраска. После захода в пресную воду лососи прекращают кормиться, переходя на использование собственных жировых запасов. Запасенного в море жира хватает на движение против течения рек до нерестилищ, постройку гнезда и откладку икры.

Всего на Северо-Востоке встречается шесть видов тихоокеанских лососей: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча и сима.

Горбуша — это наиболее мелкий и самый многочисленный лосось Северо-Востока (см. рис. 1)*. Жизненный цикл ее очень простой. Заход горбуши из моря в реки обычно происходит в июле, нерест — в августе, молодь выклевывается из икры в ноябре. Личинки в это время питаются из желточного мешка, который рассасывается к маю. В конце мая или начале июня мальки выходят из гнезд и сразу же скатываются в море. Скат молоди горбуши происходит в самый пик весеннего половодья или на его спаде. В это время мальков поедают чайки и хищные ры-

* *Здесь и далее ссылка на рисунки фотовкладки.*



Рис. 1. Горбуша-серебрянка и самец в брачном наряде



Рис. 2. Кета-серебрянка и самец в брачном наряде



Рис. 3. Нерка-серебрянка и самец в брачном наряде



Рис. 4. Чавыча-серебрянка и самец в брачном наряде



Рис. 5. Камчатская семга — самец (вверху) и самка



Рис. 6. Кунджа (вверху) и голец Леванидова



Рис. 7. Плавник восточносибирского хариуса



Рис. 8. Камчатский хариус

бы: в реках — мальма, кунджа, хариус, микижа, молодь кижуча и симы, а в лиманах — корюшка (есть мнение, что из-за своей многочисленности наибольший ущерб наносит именно корюшка). Малек горбуши уходит далеко от родных берегов — в северную часть Тихого океана и проводит там, как правило, один год — до следующего лета. Таким образом, продолжительность жизненного цикла горбуши (от нереста до нереста) — 2 года, что и определяет двухлетнюю цикличность ее численности. Многочисленные производители горбуши подхода 1981 года образовали мощное поколение 1983 года, а слабое заполнение нерестилищ в 1982-м определило ее низкую численность в 1984 году.

Горбушу-серебрянку проще всего отличить от других лососей по тонкому хвостовому стеблю и круглым черным пятнам на хвостовом плавнике, а также по небольшим размерам — обычный ее вес 1,5—2 килограмма. Самцы горбуши (как и у других лососей) крупнее самок (бывают до 4,5 килограмма). Встречаются и очень мелкие (автору этих строк приходилось вылавливать экземпляр весом всего 350 граммов). Средние размеры и вес горбуши в годы с ее высокой численностью — меньше.

После захода в пресную воду горбуша быстро лошает, приобретая коричнево-белозеленую расцветку. У самцов, кроме того, сильно удлиняются и загибаются челюсти (особенно верхняя), вырастает высокий плоский горб. За этот горб рыба и получила свое название.

Этот лосось не имеет четкого хоминга (воз-

врата точно в ту реку, где выклюнулся из икры), обычно он придерживается одной и той же группы рек. Например, горбуша, скатившаяся мальком из Армани, с большей вероятностью вернется в одну из рек Тауйской губы, чем в Охоту или Гижигу.

Использует горбуша нерестилища руслового типа, ее гнезда располагаются в основном на плесах с галечным дном в среднем течении рек. В годы с высокой численностью нерестилища оказываются переполненными производителями, и размножающиеся позднее рыбы при постройке гнезд выкапывают уже отложенную икру.

Рыболовы-любители Магаданской области ловят горбушу по лицензиям: в море — сетью, а в низовьях рек — на спиннинг. Горбуша хорошо берет на крупные яркие колеблющиеся блесны с тройниками № 8,5 — 10. Приманки нужны тяжелые (20—40 граммов), поскольку лов обычно ведется на быстром течении. Небольшие вращающиеся блесны горбуша, по моим наблюдениям, берет плохо. Колеблющаяся блесна при проводке не должна вращаться, поэтому наиболее пригодны симметричные удлиненные приманки с вялой икрой, лучше — с S-образным продольным профилем. Первые секунды после заброса леску можно не подматывать — пусть блесна играет у дна, разворачиваясь по дуге. Горбуша — одна из самых сильных и быстрых наших рыб, особенно самки. Попав на крючок, они резко бросаются из стороны в сторону, делают красивые свечки (выпрыгивают торчком из воды) и поэтому чаще сходят с крючка.

Самцы, напротив, в реке быстро лошают, становятся плоскими и зачастую не оказывают сопротивления, просто сильно, без рывков тянут леску.

Некоторые рыболовы, не умея вызвать поклевку горбуши, сознательно идут на нарушение закона: ставят слишком крупные тройники на блесну, при проводке ее делают вслепую резкие подсечки.

Конечно, при такой ловле случается забагрить рыбу за спину или за хвост — но сколько ее губится зря! Да и в спортивном отношении такая, с позволения сказать, рыбалка сильно уступает блеснению.

Горбуша и другие лососи в реке передвигаются не равномерно, а как бы рывками — быстро проходят перекат, а потом отстаиваются некоторое время в местах с более медленным течением. Поклевки на блесну чаще всего делают именно остановившиеся рыбы. Рыболов должен уметь по цвету воды, по сбоям струи и водоворотам угадывать борозды перекатов, участки с резким изменением глубины, затопленные коряги и т. п. В таких местах чаще всего создается замедленное течение или противоток, что привлекает рыбу. Прицельный отлов таких точек значительно результативнее, чем прочесывание блесной всей площади плеса или переката. Опытного рыболова можно узнать по тому, что он даже на незнакомом месте сразу же посылает приманку куда нужно, и поклевка у него будет с первых же забросов. Кроме того, важно научиться чувствовать дно — уметь вести блесну в непосредственной близости от него. Один из приемов —



Кета

ведение блесны уступами: после нескольких оборотов катушки делают паузу, продолжительность которой зависит от скорости течения, веса приманки и глубины. Все сказанное относится и к ловле других речных рыб.

Кета (рис. 2). Жизненный цикл кеты сложнее, чем у горбуши. Ее мальки обычно уходят в море в первое лето после выклева, очень редко они задерживаются в пресной воде на год. В отличие от молоди горбуши малек кеты имеет на серебристом фоне поперечные темные полоски. Кета скатывается в море медленнее, чем горбуша, и питается в реке. В море она проводит от 2 до 6 лет (чаще 3—4 года), затем заходит в реки для нереста.

От горбуши, чавычи, симы и кижуча кета-серебрянка отличается полным отсутствием пятнышек на спине и хвостовом плавнике. Кроме того, у зашедшей в реку кеты зачастую бывают видны слабые признаки брачного наряда — розоватые или серые поперечные полосы. В полном брачном наряде кета отличается от других лососей яркой окраской в виде поперечных красно-зеленых с черным полос. У самцов вырастают настолько большие зубы, что не закрывается рот.

В отличие от горбуши кета, как правило, проявляет четкий хоминг. Нерестовый ход ее обычно растянут (например, в реку Тауй она может заходить с начала июня до начала сентября), в некоторых реках наблюдается несколько подходов, хотя основная масса входит в пресную воду после горбуши — в августе. Кета достигает длины более метра и веса 14 килограммов, обычный вес самцов составляет 4—5, а самок 3—4 килограмма. Вес и жирность кеты различных стад зависят от средней длины нерестовой миграции в реке, то есть от расстояния до основных нерестилищ.

Кета по численности — второй после горбуши вид лососей Магаданской области, а в бассейне реки Анадырь она преобладает. В реках Тауйской губы Охотского моря кета находится в депрессии, тем не менее допускается ее ограниченный вылов по лицензиям.

Спиннинговая снасть нужна такая же, как и для горбуши, но годятся и вращающиеся блесны. Блесну кета по сравнению с горбушей и кижучем берет менее активно, поэтому ловить ее труднее. Необходимо хорошо чувствовать глубину и вести приманку в замедленном темпе, строго у дна. На крючке кета сопротивляется довольно вяло, действуя больше своим весом, и редко выпрыгивает из воды. Впрочем, крупный самец вполне способен вырвать из рук ручку катушки и сделать бросок от берега на 10—15 метров.



Кижуч

Кижуч. Жизненный цикл этого лосося весьма сложен. Мальки кижуча не сразу скатываются в море, а живут в пресной воде 1—3 года, часто заходят в озера. Маленького кижуча нетрудно отличить от молоди гольца и хариуса: он высокотелый, сплющен с боков, пасть и глаза у него гораздо больше. Кижучата (длиной 7—12 сантиметров) летом и зимой активно клюют на любую натуральную наживку и часто вынуждают рыболова уходить с приглянувшегося места. Опытные рыбаки знают: если попалось несколько кижучат подряд, нужно менять место — мальмы и хариуса скорее всего здесь не будет. Дело в том, что кижуч занимает места с очень тихим течением, а мальма и хариус их обычно избегают. Некоторые рыболовы (особенно подростки) не умеют отличать кижуча от гольца и десятками ловят рыбешек весом 10—15 граммов, а ведь из них через пару лет могли бы вырасти крупные рыбины. Малек кижуча поедает падающих в воду насекомых, водных беспозвоночных, а в начале лета — покатную молодь горбуши. В море этот вид

питается мелкой рыбой и ракообразными.

Кижуча-серебрянку легко отличить от кеты и нерки по небольшим темным пятнышкам на спине и боках, а также по более высокому хвостовому стеблю. Брачный наряд кижуча однотонный, без полос и пятен — рыбы приобретают красно-бурую или темно-малиновую окраску. У самцов к моменту нереста вырастает большой, нависающий над концом нижней челюсти «нос» (см. рис. на обложке).

Кижуч достигает рекордного веса — 14 килограммов, но обычно бывает от 3 до 4 килограммов. В море этот лосось проводит чаще всего полтора года. Незначительная часть рыб (всегда самцы) созревает и входит в реки, пробыв в соленой воде только одно лето. Это так называемые каюрки — мелкие кижучи весом менее килограмма, участвующие в нересте наряду с крупными самцами. Заход кижуча в реки начинается с первых чисел августа, пик хода — обычно с 15 по 25 августа, растянутый ход наблюдается в течение сентября. Нерест происходит позже, чем у других лососей, и под Магаданом может продолжаться до января, а на Камчатке — и в феврале.

Кижуч для спортивного рыболовства — одна из наиболее интересных рыб Северо-Востока. Ловля его спиннингом очень красива, но не представляет особой сложности даже для новичков — разумеется, при достаточной численности в реке. Подобно другим лососям кижуч в реке совершенно не питается, но жадно берет блесну. Причины этого до сих пор точно неизвестны. Вероятно, играет роль и остаточный пищевой рефлекс, и инстинкт

защиты потомства от пожирателей икры — мелких гольцов.

Кижуча ловят спиннингом средней жесткости с леской прочностью 12—18 килограммов. Увлекаться излишне жесткими удилищами и толстой леской не рекомендуется — снасть получается грубой, не амортизирующей рывки рыбы, отчего бывают частые сходы. Магаданские рыболовы используют для ловли кижуча колеблющиеся блесны длиной 8—12 сантиметров и весом 20—45 граммов, с тройниками № 10—12. На Камчатке, напротив, применяют крупные легкие вращающиеся блесны с тяжелым грузилом на отдельном поводке. Вероятно, это дело вкуса — я с успехом применял и тот и другой тип оснастки. Камчатская оснастка удобнее на быстром течении, особенно при солидной глубине. Пойманный на крючок кижуч сильно сопротивляется, делая развороты, броски к берегу, свечки. Вытаскивая эту рыбу, обычно приходится несколько раз сдавать леску с катушки. Один из взявших мою блесну кижучей (рыба весом не более 2 килограммов) дал подряд, каскадом 6 свечей, тут же кинулся в сторону берега и, ослабив леску, сошел с тройника. Столь сильным сопротивлением отличаются рыбы, недавно зашедшие из моря.

«Розовый» кижуч с признаками брачного наряда ходит на блесне более вяло, но обычно сильнее кеты одного с ним веса. Изредка кижуч берет искусственную мушку или насаженную на крючок лососевую икру, зачастую сокрушая не рассчитанную на крупную рыбу снасть.



Нерка

На Тихоокеанском побережье Канады и США рыболовы-любители ловят кижуча спиннингом на блесны и нахлыстом на крупную мушку с длинным оперением (стри́мер).

Нерка, или красная (рис. 3), в отличие от других тихоокеанских лососей обычно нерестует в озерах, обязательно в местах выхода ключей. Изредка встречается и речная нерка: ее нерестилища расположены на речных плесах и в затонах. Подходящие для размножения озера этот вид находит не во всех бассейнах. В частности, в районе Магадана нерка в небольших количествах заходит только в реки Ола и Тауй. Много нерки в реке Охота и в некоторых бассейнах Камчатского полуострова, крупные стада этого вида обитают также в озерных системах Корякского нагорья и Чукотки. Молодь нерки нагуливается в озерах — обычно от одного до трех лет, затем она скатывается в море — чаще всего на 2 или 3 года. Хоминг у данного вида выражен весьма четко: большинство рыб возвращается не только в то же озеро, но и на то же самое нерестилище, где родились.

424797
Хасынская ЦБС
Магаданская обл.

Заход нерки в реки начинается в мае — раньше, чем у других лососей, нерестовый ход продолжается до конца июля. Рыболовам-любителям вылов нерки разрешен на территории Магаданской области по лицензиям только в первой половине лета. Блесну нерка берет менее активно по сравнению с другими лососями. Нерка-серебрянка размерами и формой тела похожа на кету. Отличить эти виды проще всего по числу тычинок на первой жаберной дуге: у кеты их 19—25, а у нерки всегда больше 30. Есть простой способ различать эти виды: свежепойманную кету можно одной рукой поднять за хвост, а у нерки плавниковые лучи более мягкие, и она обязательно выскользнет. Брачный наряд этого лосося ярко-красного цвета (только голова зеленая), отсюда и второе название — красная.

У нерки встречаются мелкие проходные самцы-каюрки, а также постоянно живущие в пресной воде карликовые самцы, нерестующие вместе с проходными самками. Бывает и жилая нерка — кóкани, живущая в некоторых озерах, например, в озере Кроноцкое на Камчатке. Это мелкая рыба длиной до 30 сантиметров. Самцы и самки кокани гибнут после первого нереста. Кокани хорошо ловится на спортивную снасть (мушки, мелкие блесны). В качестве объекта спортивного лова и важного корма для крупных хищных рыб ее вселили во многие озера на западе Северной Америки. Вероятно, следует подумать об искусственном расширении ареала этой интересной для спортивного лова рыбы и на Дальнем Востоке.

Чавыча (рис. 4) достигает веса 57 ки-



Чавыча

лограммов. Это самый крупный из тихоокеанских лососей и крупнейшая пресноводная рыба Северо-Востока. В пресной воде мальки этого вида могут проводить один или два года, но часть рыб, подобно кете и горбуше, скатывается в море сразу же после выхода из гнезд. В море чавыча живет до 5 лет, а затем возвращается в реки для нереста. Заход ее в пресную воду начинается в мае, пик хода падает на вторую половину июня, а отдельные экземпляры ловятся до сентября. Наряду с крупными рыбами в нерестовом стаде встречаются каюрки (самцы длиной 22—47 сантиметров) и карликовые самцы. Последние созревают при длине 8—10 сантиметров в первый год речной жизни.

Основные нерестовые реки азиатской чавычи находятся на Камчатке и Корякском нагорье, небольшие ее стада есть и на Чукотке. Единично чавыча (вероятно, западнокамчатская) попадается и на Охотском побережье, в районе Магадана. Чавыча — превосходный объект спортивного лова. Лицензионный ее

лов организован на Камчатке. Обычный вес в уловах на лицензионном участке на реке Большая — от 5 до 12 килограммов, некоторым счастливцам удавалось вытаскивать до 25 килограммов и более крупных рыб. Лов ее обычно совпадает со временем половодья. Чавыча жадно хватает блесну.

Блесны на Камчатке применяют только вращающиеся, крупного размера — с лепестком овальной формы длиной 40—50 и шириной около 30 миллиметров. Стержень блесны должен быть сделан из прочной стальной проволоки, тройник — не менее № 15. Чтобы блесна была более заметной для рыбы, ее делают из полированного металла (латунь, мельхиор), украшают красными или оранжевыми бусинами, а на тройник ставят цветное оперение. Грузило весом 50—100 граммов подвешивается на полуметровом поводке в метре выше блесны (см. «Спиннинг»). Леска должна выдерживать нагрузку не менее 20—30 килограммов.

Ловля чавычи требует терпения: приходится тщательно облавливать глубокие плесы реки, делать множество пустых проводок, чтобы ощутить хотя бы одну поклевку. Камчатские рыболовы считают, что иметь одну-две поклевки за день лова — уже хорошо, а выловить чавычу — удача. Хватка этой рыбы обычно ощущается как короткий резкий толчок. Чавыча — рыба сильная (хотя и не очень быстрая) и при неправильном вываживании может сокрушить любую снасть. Рыбу весом более 10 килограммов всегда приходится по нескольку раз отпускать на 10—40 метров и вновь осторожно подтягивать (особенно опас-



Сима

ны для снасти моменты, когда рыба у самого берега начинает резко мотать головой). Чавыча редко выпрыгивает из воды целиком, чаще она только показывает спину. Сильное течение камчатских рек затрудняет вытаскивание этой крупной рыбы. Опытные рыболовы, которые совершенно не церемонятся с кижучем (вытаскивают его на берег волоком или прямо за леску перебрасывают через борт лодки), чавычу всегда берут багориком. Это разумно — на мелководье у берега она иногда просто неистовствует и способна порвать леску диаметром 0,8—0,9 миллиметра.

Сима — теплолюбивый лосось, основной ареал — реки Приморья, Кореи и Японии. В небольших количествах этот вид встречается в реках Западной Камчатки. Сима-серебрянка формой, размерами и темными пятнышками на теле похожа на кижуча, а брачный наряд ее — с яркими малиновыми поперечными полосами. Нерестовый ход симы происходит в те же сроки, что и у чавычи. Нерестилища расположены в мелких быстрых ручьях, а молодь до ската несколько лет проводит в пресной воде. Мальки этого вида на-



Микижа

поминают кижуча, но симу легко отличить по зеленоватому металлическому блеску и бледно-розовой полоске вдоль боковой линии. Сима превосходно берет блесну. Лицензионный лов ее организован в Приморье.

Род Тихоокеанские благородные лососи. Микижа (изображена на четвертой странице обложки) — эта интересная рыба встречается во многих реках и озерах Камчатки, а также на Шантарских островах в Охотском море. Ближайшим ее родственником является американская радужная форель, которую часто разводят в прудовых хозяйствах. Микижа — слегка уплощенная с боков серебристая рыба с множеством черных пятен на теле и яркой розовой полосой вдоль боковой линии. Обычно встречаются экземпляры весом от 0,5 до 1,5 килограмма, но иногда и гораздо крупнее. Нерест ее в отличие от большинства лососевых происходит весной — в мае или июне. Микижа предпочитает быстрое течение, на тихих плесах встречается редко.

Это одна из самых интересных для спортивного лова рыб Северо-Востока СССР, по крайней мере мне ее ловля на спиннинг и особенно мушку нравится больше всего.

Чтобы поймать микижу, нужно хорошо владеть снастью, уметь сделать прицельный заброс, провести маленькую блесну возле самых коряг. Излюбленные места стоянки этой рыбы — заломы и отдельные бревна на быстром течении, а также подмытые берега, где проходит струя. Некоторые экземпляры стоят и в ямах, но обязательно под заломами и близко к струе. В подходящей реке буквально у каждой застрявшей на течении коряги (даже на глубине всего 30 сантиметров) держатся одна-две микижи. В медленнотекущих, заросших водной растительностью речках не столь характерны места, где можно встретить эту рыбу, но и здесь она предпочитает нависающие кусты и другие укрытия.

Для ловли микижи на спиннинг очень удобна камчатская оснастка с грузилом весом 20—40 граммов, хорошие результаты дают мелкие белые или двухцветные (бело-желтые) вращающиеся блесны с тройником № 7. Поклевка ее обычно довольно слабая и ощущается как легкое вздрагивание удилища. После подсечки микижа бурно сопротивляется: делает по нескольку прыжков каскадом, «глиссирует» по самой поверхности воды. Пасть у нее довольно прочная, и при правильном вываживании сходы бывают редко. Микижа охотно берет искусственную мушку, и именно при ловле на мушку показывает, на что она способна — вероятно, даже небольшой тройник ослабляет эту нежную рыбу. Взявшая на мушку микижа легко выпрыгивает из воды на полторы-две свои длины и часто ломает даже крупные крючки, которые выдерживали хариуса и мальму вдвое



Камчатская семга

больше весом. Она может оборвать леску прочностью намного больше своего веса.

Иногда микижа держится в затопленных кустах, под нависшими над водой деревьями. В этих случаях я ставил на спиннинг небольшую колеблющуюся блесну — ложку неяркой раскраски (без грузила) и ловил по способу отвесного блеснения — в промежутках между корягами.

Камчатская семга (рис. 5) — эта во многом еще загадочная рыба заходит во многие реки Западной Камчатки — от Большой до Тигиля. Пока неизвестно, является ли она проходной формой микижи или это разные (хотя и близкие) виды рыб. Камчатская семга заходит в реки осенью и всю зиму стоит в ямах, практически не питаясь. Нерест ее происходит в начале июня. После нереста многие рыбы не погибают и вновь скатываются в море на нагул — семга может метать икру до 5 раз в течение жизни. Вес ее обычно составляет от 4 до 10 килограммов.

Основные внешние признаки камчатской семги — круглые черные пятна на голове и теле, а также мощный хвостовой стебель. У нерестовавших рыб (как и у гольцов) нижняя челюсть разрастается и образует «крюк», а на

верхней появляется выемка. У тихоокеанских лососей в брачном наряде, напротив, увеличивается в основном верхняя челюсть. Во время нереста камчатская семга темнеет, покрывается черными пятнами, а на ее боках появляется яркая малиновая полоса — примерно такой же брачный наряд и у микижи.

В настоящее время численность камчатской семги невелика и вылов ее запрещен. Близкий к ней стальноголовый лосось, обитающий в западных реках Северной Америки, является прекрасной для спортивного лова рыбой — его ловят и на блесну, и на крупную мушку. Вероятно, после восстановления запасов камчатской семги будет возможен ее лов по лицензиям.

Род Гольцы. От других лососевых гольцы отличаются очень мелкой чешуей — на ощупь рыба кажется голой, о чем и свидетельствует ее название. На территории Магаданской и Камчатской областей водится около 10 видов гольцов. Различать их проще всего по окраске, особенно хорошо выраженной в период нереста. В отличие от тихоокеанских лососей гольцы нерестуют несколько раз в течение жизни, хотя после каждого нереста часть рыб гибнет. Проходные гольцы зимуют в пресной воде и ежегодно выходят в море на нагул, жилые постоянно обитают в реках и озерах. Некоторые виды (мальма, кунджа) отличаются широкой экологической пластичностью и образуют стада самых различных типов: проходные и жилые (пресноводные), среди которых различают речные, озерно-речные, озерные и карликовые ручьевые. Некоторые виды гольцов являются «узко специали-

Мальма

зированными». Таковы, например, все палии — гольцы, которые никогда не выходят в реки и ручьи, и весь их жизненный цикл (включая нерест) проходит в стоячей воде.

Мáльма (см. вторую страницу обложки). Местное название этой рыбы на Охотском побережье — мальмá, а на Камчатке и Чукотке — голец. Наиболее широко распространена проходная форма мальмы, совершающая периодические миграции из рек в море и обратно. Мальма обитает практически во всех реках Магаданской области, за исключением относящихся к бассейну Колымы. В Колыму она заходит редко, известна только в низовьях. На Охотском побережье, а также на Камчатке и Чукотке мальма, наряду с горбушей, относится к самым многочисленным видам пресноводных рыб. Наиболее крупные экземпляры весом до 12 килограммов заходят в реки бассейна Северного Ледовитого океана, а в Охотском море даже трехкилограммовые рыбы встречаются редко.

Молодь мальмы живет в пресной воде от 2 до 9 лет (чаще 3 или 4 года), затем начинает совершать ежегодные миграции в море. Молодь, остающаяся в этом сезоне в пресной воде, имеет серовато-желтую или серую окраску с темными поперечными полосками (малковые полосы) и красноватыми пятнышками на боках. В мае — июне в реках попадается мелкая мальма длиной 15—17 сантиметров блестящей однотонно-серебристой окраски — это так называемые смóлты, или покатники, впервые скатывающиеся в море. После 2—3 месяцев нагула в соленой воде покатники заметно вырастают и до середины сентября возвращаются в реки, имея средний вес 100—150 граммов. После второго ската в море мальма достигает длины 28—35 сантиметров, веса — 300—500 граммов, а после третьего ската длина ее 37—41 сантиметр и вес 600—900 граммов. В этот период она обычно впервые созревает. Общая продолжительность жизни североохотской мальмы 9—11 лет. Скат всех возрастных групп ее в море происходит в конце мая и июне, обычно совпадая с ледоходом и весенним половодьем в данном бассейне.

Молодь мальмы до ската в море живет в реках, придерживаясь быстрин и перекатов, участков с каменистым дном. Часть потомства проходных рыб может созревать при длине 12—15 сантиметров, не выходя в море,— это всегда самцы. Карликовые самцы отличаются от незрелой молоди более темной и яркой окраской, а также хорошо развитыми гонадами (половыми продуктами). Напротив, у незрелой молоди лишь с трудом можно различить тоненькие «ниточки» гонад: у самок — желтоватые, у самцов — розовые. Карликовые самцы всегда обитают в районе нерестилищ мальмы — в истоках рек, а ближе к морю преобладает незрелая молодь проходных рыб. Незначительная часть карликовых самцов мо-

жет, прожив до 9 лет в реке, скатываться в море и превращаться в проходную форму. В косяках проходной мальмы встречаются и каюрки — самцы весом 120—150 граммов, созревшие после одного лета, проведенного в море. На Камчатке есть жилая, не уходящая в море мальма,— речная и озерная. В ручьях, куда не заходят проходные рыбы, встречается жилая карликовая мальма. И самцы, и самки карликовой ручьевой мальмы созревают в пресной воде при длине 11—14 сантиметров и весе 20—40 граммов.

Магаданские рыболовы все три группы мелкой мальмы называют форелью (форелькой) и обычно не умеют их различать. Та «форель», которую в массе вылавливают с ноября по апрель в нижнем течении рек Ола, Армань, Яна в районе Магадана, в реке Большая Гарманда у поселка Эвенск, является молодью проходной мальмы. В истоках рек Дукча, Магаданка и Окса, в притоках Танона и Хасына и во многих самостоятельных ручьях побережья обитают жилые карликовые гольцы. У большинства вылавливаемых здесь рыб к концу лета уже зрелые икра и молоки. Карликовые самцы проходной мальмы ловятся, например, в истоках рек Ола и Яма. Любой рыболов может убедиться, что зрелые самки среди мелкой мальмы практически не встречаются, а самцы длиной 13—20 сантиметров имеют хорошо развитые молоки. Карликовые самцы участвуют в нересте с крупными проходными самками.

Проходная мальма составляет основу любительских уловов на охотоморском побережье и на Камчатке, ловля ее в различные сезоны

имеет свои особенности. Зимой мальма практически не перемещается, поэтому на доступных для массовых посещений участках рек к декабрю уже почти не остается крупной рыбы. Только в апреле, когда начинаются первые подвижки гольцов вниз по течению, в обловленных еще с осени ямах вновь появляется рыба. Зимой клев мальмы непостоянный, иногда она берет приманку только 1—2 часа в сутки. На побережье Охотского моря ее обычно ловят на мормышки с наживкой (икра, личинки ручейников), на Чукотке используют блесны. В апреле — мае клев активизируется, ловить в это время можно не только из-подо льда, но и в промоинах на летние снасти. К началу — середине мая лед на реках Камчатки и охотоморского побережья бывает уже размыт, остаются только закраины и отдельные перемычки на ямах со слабым течением. Мальма в это время предпочитает держаться подо льдом, особенно в солнечные дни, иногда приходится ловить ее на глубине полтора метра при толщине льда больше метра. На открытой воде она появляется только рано утром или под вечер. Здесь ее обычно ловят на поплавочную удочку, на широких полыньях можно использовать также ходовую донку и спиннинг. Когда только начинает прибывать вода в реках, еще можно рассчитывать что-нибудь поймать из-подо льда, но вот вода уносит закраины, и ловить можно только по-летнему. Пока вода еще не слишком мутная (дно видно на глубине 25—40 сантиметров), хорошие результаты дает спиннинг с вращающимися блеснами (в основном из белого полированного металла),

годятся и небольшие колеблющиеся. По более мутной воде можно ловить на ходовую донку или на поплавочную удочку с мормышкой. В начале половодья на крючок насаживают личинки ручейника или икру, позже начинают ловить также на опарышей, сало или сырое мясо. Одновременно с мальмой на те же снасти попадаются кунджа и хариус.

Отмечено, что мальма и другие проходные гольцы при скате в море зачастую движутся вместе со льдом. Иногда приходится забрасывать удочку прямо под плывущие льдины.

Весной мальма поедает скатывающихся в море мальков кеты и горбуши. В это время она хорошо берет мелкие легкие блесенки (типа удлиненных мормышек) из белого металла. Эти блесенки ставят на поплавочную удочку или ходовую донку вместо крючков, наживки весной зачастую не требуется. В те годы, когда мало снега и скат молоди лососей происходит по невысокой относительно прозрачной воде, мальма прекрасно клюет на крупную искусственную мушку. Мушки для этой ловли должны иметь блестящее серебристое тельце: их нужно изготавливать на длинных одинарных крючках № 6—8,5. Можно также использовать двойные крючки № 5—7 или же делать трубчатые мушки с тройником № 5 (см. «Искусственные мушки»). Признаком возможного клева мальмы на мушку является ее игра — всплески во время заглатывания мальков. Обычно я наиболее крупную утяжеленную мушку ставлю на полметра ниже утяжеленного поплавка и одну-две более мелкие — выше него на отдельных поводках. Особенно охотно мальма

берет мушку на 5—10 сантиметров ниже поверхности воды, поклевка ее бывает заметна по буруну или всплеску. В некоторые дни мая лов мальмы на мушку гораздо результативней, чем на икру или наживку. Мне приходилось удачно ловить мальму на мушку даже среди дня в солнечную погоду, когда клев ее на удочку и спиннинг резко ослабевает. К середине июня вся проходная мальма уходит в море.

Заход мальмы в реки начинается в июле вместе с горбушей. Первыми в пресную воду входят крупные рыбы, которые готовятся к нересту в этом сезоне. Нерестилища мальмы расположены выше, чем у других лососевых,— у истоков рек. Так, горбуша по реке Яма поднимается не больше, чем на 100 километров, кета — до 200 километров, а мальма доходит до самых Элекчанских озер, проходя около 300 километров и поднимаясь до высоты более 800 метров над уровнем моря. И жилая и проходная мальма, как и другие гольцы, нерестует осенью (в сентябре или первой декаде октября). Нерест не ежегодный, не участвующие в размножении особи заходят в реку позже основного нерестового косяка (в августе) вместе с незрелой рыбой. Пропускающие нерест гольцы отличаются отсутствием брачного наряда, крупными размерами (вес больше килограмма), хорошей упитанностью и слабым развитием гонад. Кроме того, от первого нереста у мальмы остается крюк на нижней челюсти и выемка на верхней, особенно хорошо заметные у самцов. Последними (в начале сентября) в пресную воду входят самые мелкие особи весом 100—

150 граммов. Незрелые и пропускающие нерест рыбы не доходят до нерестилищ мальмы и обычно зимуют на ямах среднего течения рек.

Во время созревания икры и молок у мальмы, как и у других лососевых, развивается брачный наряд. Особенно ярко бывают раскрашены самцы: спина и бока зеленые с яркими красными пятнами, брюхо ярко-красное, голова черная с желтой полосой снизу челюстей, парные плавники трехцветные — красно-черно-белые. Кроме того, у самцов вырастают горб и большой крюк на нижней челюсти. Форма тела самок почти не меняется, расцветка их более скромная и состоит из черных, зеленых и коричневых тонов. Готовая к нересту мальма настолько резко отличается от заходящих из моря серебристых рыб, что многие считают их разными видами. Серебристую рыбу под Магаданом называют мальма, а нерестующую — топь. Вообще со словом топь (от якутского *тоб* — голец) происходит большая путаница. Кроме мальмы в брачном наряде, магаданские рыболовы этим словом называют также белого гольца, гольца Леванидова (см. ниже) и некоторых озерных гольцов.

Осенью во время образования шуги наблюдается перемещение мальмы вниз по течению, вызванное резким падением уровня воды в этот период. Некоторые рыболовы объясняют, что мальма осенью скатывается в море. Но это неверно: до моря рыба не доходит, а просто смещается вниз по течению до более глубоких участков, где и будет зимовать. В Охотском море мальма и другие гольцы

перезимовать не могут: лососевым рыбам не выдержать наблюдающихся подо льдом отрицательных температур. Горбуша и другие лососи, проводящие по нескольку лет в океане, на зиму уходят южнее плавающих льдов.

В июле и августе зашедшую в реки мальму чаще ловят на поплавочную удочку в проводку. Необходимо учитывать, что подъем рыб по реке происходит в основном у берегов, где течение несколько слабее. Рыба охотно задерживается там, где струя отбивается от берега и образуется противоток — суводь. Зачастую приходится ловить, пуская поплавок в одном-двух метрах от берега, а чтобы не спугнуть рыбу, необходимо стоять достаточно далеко от воды. Почти единственная наживка в этот период — лососевая икра, отварная или же сырая, в тампонах из капронового чулка. Иногда, впрочем, удается неплохо ловить на цветной поролон, окрашенные шарики пенополистирола или ягоды брусники. Такие обманки мальма берет на быстром течении. Хорошее средство активизировать клев — украсить цевье крючка крупной бусиной из ярко-красной или розовой прозрачной пластмассы.

Крупную проходную мальму, обитающую в реках Чукотки, ловят в основном на спиннинг. Местные рыбаки считают, что крупный голец берет блесну намного активнее мелкого. Ловят обычно на средней величины колеблющиеся блесны из белого металла или комбинированные. Приманки нужны достаточно тяжелые, неширокие и с хорошей игрой. Наиболее употребимый размер тройников — № 10, крючки не должны быть слишком тонкими. Крупные экземпляры проходного голь-

2 Заказ № 676

ца сильно сопротивляются, а пасть у них довольно нежная. Вываживать эту рыбу следует аккуратно, иначе будет много сходов.

В сентябре подъем против течения северо-охотской и камчатской мальмы заканчивается, рыба задерживается на обширных плесах среднего течения рек, заходит в речки и боковые протоки, где расположены нерестилища кеты и кижуча. В этот период в основном ее ловят на поплавочную удочку или ходовую донку. Осенняя ловля в общем сходна с летней, но вместо крючков чаще приходится применять мормышки или легкие блесенки. Днем обычно ловят вдали от берега, делая забросы на фарватер реки, в вечерних сумерках рыба зачастую подходит к самому берегу. Осенью мальма, особенно крупная, хорошо берет на спиннинг, предпочитая вращающиеся блесны. Местами ее удачно можно ловить и на искусственную мушку — на удочку или кораблик. Наиболее активный клев мальмы на мушку бывает в среднем и верхнем течении рек, где нет или мало нерестилищ лососей. Здесь часто можно заметить всплески рыб, поедающих упавших на воду насекомых. В августе и сентябре мальма клюет на мушки различных типов, в том числе и на обычные хариусовые, но лучше использовать особые — более яркие и крупные приманки на прочных крючках № 6, 7 или 8, а также на тройниках — № 4 или 5. Мальма берет мушку жадно, но неуверенно, и зачастую промахивается, пустых поклевок бывает больше, чем при ловле хариусов. Лов на мушку результативен чаще на неглубоких плесах, в больших ямах удобнее ловить на блесну.

С середины октября после начала образования шуги ловят в основном на поплавочную удочку, донку и спиннинг затруднительно применять из-за обмерзания лески. В ноябре — декабре вблизи городов и поселков крупной мальмы почти не остается — зазимовавшая здесь рыба выловлена, а нового подхода нет. В это время в любительских уловах преобладает молодь проходной мальмы весом 20—40 граммов, реже попадаются рыбы, выходившие один раз в море (вес до 150 граммов).

Мне кажется, что вылов молоди мальмы необходимо ограничить, так как он может оказать существенное воздействие на численность проходного стада.

У мальмы, как и у всех лососевых, молодь которых обитает в пресной воде, существует четкий хоминг. Живущие в различных бассейнах стада мальмы обособлены друг от друга, и охранять нужно каждое стадо в отдельности. В районе Магадана наиболее заметно воздействие чрезмерного любительского вылова на популяцию мальмы реки Ола. В октябре 1985 года мною просмотрено 76 экземпляров крупной и средней мальмы, выловленной в реке Ланковая (притоке Олы): 15 из них имели совсем свежие или уже зажившие повреждения рта — видно, что рыба брала на удочку и сошла с крючка. Если предположить, что срывается в среднем 20 процентов подсеченных рыб, нетрудно подсчитать, что одни рыболовы-любители за последние годы выловили почти половину всего стада ольской мальмы. А ведь кроме любителей много мальмы вылавливают и промысловики, и браконьеры...

Интенсивный лов проходных рыб в августе — октябре (и в мае — июне) в сочетании с выловом молоди с ноября по апрель привел в последние годы к резкому сокращению численности ольской мальмы (это, кстати, признают и сами рыболовы). Численность крупной чукотской мальмы в результате неконтролируемого вылова во многих бассейнах также резко снизилась.

В желудках мальмы в конце лета и осенью нередко попадается икра лососей, иногда в значительных количествах. Как уже говорилось, тихоокеанские лососи зачастую раскапывают построенные ранее гнезда, и сносимая течением икра все равно обречена. Сама же мальма не в состоянии раскопать эти бугры лососей. Во время осеннего ледохода (ноябрь) в реках Охотского побережья образуются заторы и ледяные плотины, дно в таких местах сильно перемывается. Конечно, построенные горбушей бугры оказываются размытыми, и мальма опять тут как тут. Икра встречается в желудках мальмы и в мае — в начале половодья. Не нужно думать, что в реке уже идет нерест лососей,— это неоплодотворенная икра, пролежавшая в буграх всю зиму. Только в начале июня, когда молодь лососей скатывается в море, мальма может приносить некоторый вред. Взгляд на гольцов

Интерес для любительского лова представляет и карликовая мальма. Ловят ее в ручьях (в ямках и под корягами) на легкую поплавочную удочку с крючком № 3,5—5 или с мормышкой. Карликовая мальма берет на любую натуральную наживку, но ее клев в течение дня непостоянен. Бывает, что проходишь по ручью несколько километров и почти не видишь поклевок, а на обратном пути проверяешь уже обловленные места и... в них «обнаруживаешь» массу рыбы. Ручьевая мальма берет также на небольшую искусственную мушку черного или коричневого цвета — тонущую или плавающую. При хорошем знании местности карликовую мальму можно ловить и зимой — подо льдом.

Белый голец (на Охотском побережье местные названия — озерная мальма, топь) — наиболее похожий на мальму вид. На боках белого гольца, как и у мальмы, многочисленные мелкие (мельче зрачка) красные пятна. Голова его больше, чем у мальмы, лоб выпуклее и зубы развиты лучше. В брачном наряде этот голец серо-фиолетовый или темно-серый с желтым или розовым брюхом — без характерных для мальмы зеленых и ярко-красных тонов.

По сравнению с мальмой белый голец — более хищный вид. Он отлично ловится на блес-

ма, красный голец, няйба) — это некрупный, ярко окрашенный озерный голец, относящийся к группе палий. Проходных, ручьевых и речных популяций не образует. В брачном наряде нейва имеет однотонную ярко-красную окраску с синеватыми пятнами на боках, реже встречается менее яркая, желтая или оранжевая расцветка. Спина рыб, спинной и хвостовой плавники обычно коричневые, а парные и анальный плавники — ярко-красные с белой каймой. В отдельных водоемах нейва вне периода нереста становится серебристой, но чаще она весь год носит несколько ослабленный брачный наряд.

Нейва распространена на материковом побережье Охотского моря (горные озера в бассейнах рек Охота, Иня, Ола и Наяхан). Очень похожие «красные» гольцы обитают во многих горных водоемах Верхней Колымы (озера в бассейнах рек Тенке, Эльгенья, Берелех). Встречается нейва (или близкие к ней виды) и в тундровой зоне — в достаточно глубоких незаморных озерах в низовьях рек Колыма и Раучуа, в водоемах острова Айон. Дальше на восток бассейна реки Омолон этот вид не найден, в озерах Чукотки и в бассейне реки Анадырь обитают другие виды гольцов.

В крупных водоемах нейва может достигать двух килограммов, но в большинстве озер преобладают рыбы весом 200—500 граммов, редко — до одного килограмма. Растет этот вид довольно медленно, достигая веса 400—500 граммов в возрасте 9—12 лет. У нейвы бывает также и карликовая медленнорастущая, но также озерная форма.

Нейва — ценный объект любительского

и спортивного лова, особенно интересно ловить ее из-подо льда. Зимнюю удочку с леской 0,15—0,25 миллиметра можно оснастить кивком и мормышкой среднего веса или же одним-двумя крючками № 4—6. Как правило, необходима натуральная насадка: икра лососей, личинки ручейников, кусочки рыбы или мяса (клев на «голую» блесну или красную поролоновую губку бывает далеко не всегда). Осенью и зимой лучший клев гольцов чаще наблюдается в середине дня, а весной, особенно в солнечные дни,— рано утром и в вечерних сумерках. Подобно другим рыбам, нейва предпочитает кормиться при оптимальной для нее освещенности. В летнее время этот голец попадается на поплавочную удочку с наживкой, успешным бывает лов на некрупного гольяна, который зачастую водится в тех же озерах.

Голец Таранца (третья страница обложки) встречается в водоемах Чукотского автономного округа, образуя жилую и проходную формы. В отличие от мальмы, он заходит в основном в реки, имеющие связь с незаморными озерами. Дело в том, что голец Таранца, подобно нерке, нерестует в озерах, в местах выхода ключей.

Отличить гольца Таранца от мальмы несложно: на боках у него немногочисленные, но крупные (заметно больше зрачка) розовые пятна, зачастую они кажутся «разрезанными» боковой линией.

Ловят гольца Таранца на те же снасти, что и крупную чукотскую мальму.

Озерные гольцы Чукотки. Обитающие в озерах Чукотки гольцы относятся

к трем видам: боганидская палия (озера Эльгыгытгын и Баранье), арктический голец (многие водоемы бассейна реки Амгуэма) и жилая форма гольца Таранца (озеро Нутенеут, водоемы Чукотского полуострова). Эти виды описываются вместе, так как неспециалисту их довольно сложно различить. Внешне они сходны с проходной формой гольца Таранца — на боках такие же крупные розовые пятна. Общий тон тела обычно от серебристо-серого до желтовато-серого, брачный наряд неяркий — сочетание белого, серого и розового цветов. В больших глубоких водоемах жилые гольцы достигают значительных размеров (вес до 10 килограммов и более), в неглубоких озерах обитают гораздо более мелкие рыбы. Скорость роста невелика — пятикилограммовая рыба всегда старше 20 лет, а медленнорастущие особи достигают килограммового веса только в 10—15 лет. Есть и карликовые гольцы, созревающие при длине 12—15 сантиметров.

В период открытой воды крупных озерных гольцов ловят на спиннинг, а зимой и весной — со льда на блесну. Хороший клев бывает в мае и июне — перед распадением льда. В больших водоемах гольцы чаще держатся не разреженно, а образуют скопления — косяки. В тихую погоду жирующий косяк удается обнаружить по всплескам, можно также пробовать ловить с лодки на дорожку. Там, где были поклевки, следует бросить якорь (иногда удобнее выйти на берег) и ловить спиннингом. Как правило, в озерах используют хорошо играющие колеблющиеся блесны среднего веса без дополнительного

грузила. В прозрачной воде горных озер годятся приманки любого цвета, кроме хорошо отполированных — с ярким блеском. Голец хорошо берет и на воблеры. Пасть озерных гольцов заметно прочнее, чем у проходной мальмы, и подсечка должна быть достаточно сильной. Вначале я пользовался легким стеклопластиковым удилищем длиной 170 сантиметров и толщиной у тюльпана 3,2 миллиметра. Эта «хариусовая» снасть не позволяла сделать надежную подсечку, и более половины взявших блесну рыб сходило с тройника. Гораздо лучше в этих условиях «работало» более мощное (тоже пластиковое) двуручное удилище толщиной у вершины 4,3 миллиметра. Крупные рыбы оказывают значительное сопротивление, в лодку их лучше поднимать не за леску, а с помощью багорика.

Выход жирующих косяков гольца к берегу чаще наблюдается в местах с каменистым дном. На перемещения рыб по водоему существенное воздействие оказывает направление ветра: удачный лов бывает в местах, где волны идут косо или почти параллельно берегу; напротив, в сильный накат рыба к берегам не подходит. Хорошие места для ловли спиннингом — под скалами и возле устьев впадающих в озеро ручьев (особенно после дождя).

В тихую погоду удается наблюдать, как голец берет блесну. Бывает, что к заброшенной приманке из глубины подскакивает стайка из 3—5 рыб, обычно сходных размеров. Одна из них тут же хватает блесну, а остальные сопровождают пойманную рыбу почти до самого берега или борта лодки.



Ленок

Ловля крупных гольцов со льда на блесну также очень увлекательна. Лед на больших озерах Чукотки обычно стоит до конца июня. Разумеется, выходить на этот «последний» лед можно только с пешней (необходимо постоянно проверять его прочность) и не в одиночку. На тех водоемах, где есть крупные гольцы, нужно применять блесны с подвешенным в заводном кольце тройным или лучше двойным крючком № 8,5—10. Во многих озерах Чукотки преобладают рыбы весом до килограмма, здесь более успешным бывает лов на блесну с привязанным вместо двойника одинарным крючком на длинном поводке.

Ленок. Различают две формы ленка — острорылую и тупорылую. Многие исследователи считают их самостоятельными видами. В Магаданской области (только в бассейне Колымы) обитает тупорылый ленок. Он достигает крупных размеров (наибольший вес до 8 килограммов), но чаще всего попадаются экземпляры от 1 до 2 килограммов. Это хищная рыба, хотя в его рационе заметную роль играют насекомые и их личинки. Ленок очень чувствителен к загрязнению воды. Кроме того, он быстро исчезает там, где браконьерами практикуется сплошное перегораживание речек. По этим причинам ленок на значительных участках бассейна Верхней Колымы исчез или стал очень редким видом.



Сибирский хариус

Ловят ленка на те же снасти, что и хариуса, но леску лучше иметь попрочнее и крючки на один-два номера больше. Он часто попадается и на спиннинг — на вращающиеся или небольшие колеблющиеся блесны, на «мышь» из меха или сукна. Ленка можно ловить на естественных насекомых (слепень, кузнечик), на крупную искусственную мушку — верховую или затонувшую, на «чукотскую» блесну (см. ниже); хороший клев бывает и в подледный период — на мормышку или некрупную блесну. Пасть у ленка нежная, так что вываживать его нужно осторожно.

Сибирский хариус — наиболее распространенная на Северо-Востоке рыба. Его можно встретить в больших реках и их притоках различной величины, а также в озерах самых разных типов — от мелких тундровых до холодных и глубоких горных водоемов. В нашем регионе обитают три подвида сибирского хариуса. Восточносибирский хариус (рис. 7) распространен во всем бассейне Колымы, на побережье Северного Ледовитого океана — в реках Чаунского, Шмидтовского

и Иультинского районов. Кроме того, он проник и в бассейн Тихого океана — в реку Эргувеем на Чукотке и в крупные реки материкового побережья Охотского моря — от Ульи до Ямы (за исключением бассейнов рек Яна и Тауй). Камчатский подвид сибирского хариуса (рис. 8) обитает на Камчатском полуострове, в водоемах Корякского нагорья, в реках Пенжина, Анадырь и Парень, а в районе Магадана — в Тауе и Яне с притоками. Аляскинский хариус (рис. 9) встречается только в речках крайней оконечности Азии — возле поселков Уэлен и Лаврентия, основной ареал его по ту сторону Берингова пролива — на Аляске и севере Канады.

Различать эти три подвида проще всего по рисунку спинного плавника. У восточносибирского хариуса в задней части огромного спинного плавника видно 5—7 сплошных полосок темно-красного цвета, а у камчатского вместо полос — удлиненные, частично сливающиеся пятна. У аляскинского хариуса на относительно небольшом спинном плавнике видны ряды пятнышек-точек. Камчатский хариус отличается от восточносибирского также относительно большей головой и пастью, есть разница и в форме тела — восточносибирский более высокотелый и горбатый. Небольших хариусов (длиной меньше 25 сантиметров) различать труднее. В некоторых бассейнах (например, в Гижиге) обитают популяции хариусов с промежуточными между восточносибирским и камчатским подвидами признаками, вероятно, гибридные.

По разные стороны охотско-колымского водораздела биология хариусов сильно различается. В бассейне Колымы в летнее время он может подниматься в речки и небольшие ручьи почти до их истоков. Здесь хариус не имеет конкурентов в питании и откармливается до осени, когда приходит пора скатываться вниз по течению на зимовку. Напротив, в реках Охотского побережья и Камчатки он заселяет исключительно их среднее течение, низовья и почти не встречается в верховьях, тем более в мелких и быстрых ручьях. Дело в том, что в ручьях, впадающих в лососевые реки, обитает многочисленная карликовая мальма, которую неправильно называют форелью. Эта рыба питается тем же кормом, лучше хариуса приспособлена к жизни на быстром течении и вытесняет его вниз на более тихие и глубокие участки. Встретить хариусов можно в ручьях тундрово-болотного типа — глубоких, с тихим течением и красно-бурой водой, зато карликовая мальма такие водотоки почти не заселяет. Взаимоотношения хариуса со взрослой мальмой, зашедшей в реки из моря, менее напряженные, но все же можно заметить, что хариусы избегают больших скоплений мальмы. С другим распространенным гольцом — кунджей — хариус не враждует, в реках и озерах их часто можно встретить вместе.

Известно, что хариусы могут обитать и в солоноватой воде. Так, европейский хариус из рек Швеции и Финляндии часто выходит в Ботнический залив Балтийского моря. В дельтах наших северных рек мне также приходилось ловить хариусов вблизи моря. Вода в таких местах у поверхности пресная, а у дна солоноватая. Хариус здесь держится

только в поверхностных слоях, а на глубине в том же месте могут попадаться настоящие морские рыбы — бычки-рогатки и камбала.

Хариус — оседлая рыба, он, как правило, не совершает продолжительных миграций и зачастую всю жизнь проводит в пределах одного озера или участка реки. Опытные рыбаки говорят: «Хариус везде особый». И это близко к истине. Действительно, даже в рядом расположенных и соединенных протоками озерах могут обитать совершенно непохожие рыбы. Так, в озере Джека Лондона (Верхняя Колыма) хариус быстро растет и достигает веса более килограмма, а в озере Танцующих Хариусов рост рыб намного хуже, вес — до 600 граммов. В каждом из этих водоемов обитает самостоятельное стадо (популяция) хариусов, и переход рыб из одного озера в другое — через соединяющую их двухкилометровую протоку Вариантов — не наблюдается.

Есть и озерно-речные хариусы: они зимуют в озере, но на весь сезон открытой воды поднимаются в придаточную систему — впадающие ручьи и речки. Это наблюдается, например, в системе Илирнейских озер в бассейне реки Малый Анюй. Сезонные перемещения речных хариусов (весной — вверх по реке или в притоки на нерест и нагул, осенью — скат на зимовку) обычно не превышают 10—40 километров. Так, мечение хариусов на Ангаре показало, что многие рыбы были повторно пойманы на тех же самых плесах реки, что и в первый раз, а одна особь с меткой попалась через 5 лет всего в 3,5 километрах от места мечения.

Подобно ленку, микиже и камчатской семге хариус нерестует весной или в начале лета, икрометание его, как правило, совпадает с максимальными уровнями весеннего половодья в данном бассейне. Нерестилища обычно расположены в протоках с небольшим течением и песчано-галечным дном, но нерест возможен и непосредственно в чистых озерах, вблизи берегов.

Скорость роста хариусов сильно зависит от условий существования, прежде всего от размеров и глубины водоемов, от продолжительности сезона открытой воды и обилия корма. В больших реках южной части региона (особенно там, где есть нерестилища лососей) и в крупных глубоких озерах хариус быстро растет, набирая за 8—10 лет жизни вес 1—1,5 килограмма. Наибольших размеров и веса этот вид достигает в водоемах материкового побережья Охотского моря: в озере Чистое бассейна реки Ола длина до 55 сантиметров (вес 2 килограмма), в озере Пареньское — 51 сантиметр (1560 граммов), в реке Яма — 53 сантиметра (1800 граммов) и в реке Яна — 51 сантиметр (1400 граммов). В высоких широтах рост хариуса хуже: вес рыб в десятилетнем возрасте в среднем 400—700 граммов, а самые крупные рыбы редко бывают более 1100—1200 граммов. В небольших высокогорных озерах и ручьях бассейна Колымы встречаются карликовые, очень медленно растущие хариусы, достигающие веса 100—200 граммов в возрасте 7—8 лет.

Популяции хариусов очень уязвимы, при чрезмерно интенсивном вылове их численность резко снижается, уменьшаются и раз-

меры рыб в уловах. Это наблюдается, в частности, в районе Магадана (реки Ланковая, Хасын и Армань), а также во многих районах Верхней Колымы, где влияние вылова усугубляется вырубкой леса и загрязнением рек взвесями горнодобывающих предприятий. Разработка россыпей уничтожает нерестилища рыб, а молодь их не может расти и нормально развиваться в постоянно мутной воде. Условия нагула взрослых рыб также резко ухудшаются: хариус не видит свой излюбленный корм (падающих в воду насекомых) и вынужден переходить на добывание червей и личинок вслепую со дна. Конечно, скорость роста рыб в таких местах резко снижается. Там, где раньше самой массовой рыбой был хариус (например, в верховьях Колымы), теперь преобладают чукучан (каталка) и речной гольян — эти рыбы вполне приспособлены к обитанию в загрязненной воде.

Кормится хариус преимущественно амфибиотическими (развивающимися в воде) насекомыми: личинками и взрослыми стадиями поденок, веснянок и ручейников. Он поедает любую доступную животную пищу: падающих на воду наземных насекомых, мелких рыб и даже млекопитающих — землероек и полевок. На нерестилищах лососей иногда можно заметить хариусов, стоящих ниже гнезд горбуши, кеты или кижуча. В этом случае хариус подобно мальме поедает вынесенную из гнезда икру, которая все равно бы погибла. Поэтому даже если в желудках крупных рыб мы обнаруживаем иногда по 200—300 икринок, их нельзя причислять к «опасным хищникам, уничтожающим лососей». Правда, весной, во

время ската мальков кеты и горбуши, хариус может поедать их и тем самым наносить некоторый ущерб.

Хариус не обнюхивает пищу, он хватает все, что движется и напоминает добычу. Поэтому в его желудке часто можно встретить несъедобные предметы: камешки, кусочки дерева, цветы и семена. Однажды в конце сентября на озере Джека Лондона мне пришлось наблюдать, как небольшие хариусы выскакивали из воды и хватали медленно падающие хлопья первого снега. Именно на этой «неразборчивости» основана успешная ловля хариусов на искусственные мушки.

В реках хариус предпочитает держаться под перекатами, возле основной струи, но не на быстром течении. Хорошие места — суводи (участки с обратным течением) между струей и берегом, а также ниже коряг и валунов. Крупные хариусы могут стоять и в глубоких ямах, если они не заняты косяками мальмы или горбуши. Для поисков хариусов в незнакомой реке можно придерживаться старинного правила: ищи рыбу в таких местах, которых на реке мало. Например, в быстрой реке (Парень) он стоит на тихом течении, а в очень медленной (Кава) — вблизи перекатов.

В западной части озера Джека Лондона, где по выходным дням собиралось до сотни и более рыболовов, у 41 процента взрослых хариусов я обнаружил порванные губы — эти рыбы когда-то срывались с крючка. У «среднего» рыболова при ловле на искусственную мушку срывается около трети подсеченных рыб, при использовании натуральной насад-

ки — несколько меньше. Нетрудно подсчитать, что только на удочку в этом районе любители вылавливают не менее половины общей численности стада! Конечно, такой пресс вылова не мог не привести к снижению численности: хариусов в озере Джека Лондона в несколько раз меньше, чем в сходных по характеру необлавливаемых водоемах. Введенная в Магаданской области с 1984 года штучная норма вылова хариусов (20 экземпляров в день) стимулирует рыболовов искать крупных рыб, уменьшает вылов молоди.

В течение зимы (с декабря по апрель) хариус мало передвигается по реке. До января и в марте — мае он хорошо ловится со льда на мормышки с наживкой (личинки ручейников или икра), а в некоторых реках берет и узкую ныряющую блесну. После нереста и просветления воды хариусы начинают активно клевать на мушки, а крупные рыбы — на мелкие вращающиеся блесны. Летом он может кормиться в любое время, но активное питание (и соответственно клев) наблюдается обычно 3—5 часов в сутки. Лучшее время лова в начале лета бывает под вечер и даже ночью. Как и многие другие рыбы, хариусы предпочитают кормиться при определенной (оптимальной для них) освещенности и не любят слишком яркий свет. В ясную теплую погоду в середине лета хороший клев бывает под вечер, когда еще совсем светло, но заходящее солнце окрашивает местность в желтый цвет. «Жор» хариуса длится недолго, до сумерек, но бывает очень активным — река просто кипит от всплесков рыб. В пасмурную погоду клев чаще бывает в течение дня. Ин-



Валек

тересно наблюдать за озерными хариусами в период массового вылета насекомых. Рыбы торчком выпрыгивают из воды, и одновременно в воздухе их можно видеть десятки и сотни. Именно такие картины рождают названия типа озеро Танцующих Хариусов.

Во время небольших летних паводков с помутнением воды клев на мушку ослабевает, поэтому лучше ловить в проводку на опарыша, личинок жуков-усачей (короеды) и другие светлые натуральные приманки.

Осенью хариус ловится в течение всего дня, и чем ближе зима, тем позже начинается клев. С утра, пока воздух холоднее воды, больше поклевок бывает вблизи дна на натуральные приманки (на побережье в это время часто используют отварную лососевую икру). Если среди дня воздух прогревается (становится теплее воды) и видны всплески кормящихся рыб, можно сменить на удочке оснастку и ловить на мушку. Удачным бывает и лов на спиннинг, если только нет сильного мороза. Хариус в это время «предпочитает» медные вращающиеся блесны с нешироким лепестком длиной 30—40 миллиметров.

Валек (местные названия — конек, остроноска) — этот представитель подсемейства сиговых широко распространен на Северо-

Востоке: в бассейнах рек Колыма, Анадырь, Амгуэма, Пенжина, Парень и Охота, на севере Камчатки, обитает и в некоторых холодных озерах — Илирней, Нярка. В отличие от других сигов у валька округлое (не уплощенное с боков) тело с розоватой чешуей, парные плавники красноватые, рыло заостренное, рот маленький, полунижний. Валек бывает довольно крупным (наибольший вес около 2 килограммов), но обычно в уловах преобладают особи от 400 до 600 граммов. Нерест валька, как и у всех сигов, происходит осенью — в конце сентября или октябре. Кормится он в основном донными беспозвоночными, поедает также мелких рыб (в частности, бычков) и икру лососей. Молодь валька напоминает мальков хариуса: она имеет желтоватую окраску с темными поперечными полосами.

Со льда валька можно ловить на удочку с небольшим грузилом и прочным крючком не крупнее № 4. На крючки № 5—7, на которые обычно ловят мальму, хариуса и сига, валек попадается реже и зачастую сбивает наживку. Летом он ловится на легкие донные удочки и закидушки (если использовать небольшие крючки). Валек — сильная рыба (сильнее хариуса того же веса), при вытаскивании он оказывает существенное сопротивление.

Нельма водится только в двух крупнейших бассейнах региона — в реках Колыма и Анадырь. Ее нетрудно отличить от других сиговых рыб по более массивной голове с большим конечным ртом и очень мелкими зубами на челюстях. Эта рыба достигает крупных размеров — длина до 160 сантиметров, вес до 49 килограммов. Созревание ее наблюдается в возрасте от 10 до 14 лет при длине не менее 70—80 сантиметров. Нельма — хищная рыба, хотя она и не может заглатывать столь крупную добычу, как щука или налим того же веса. В настоящее время численность нельмы в результате нерационального промысла и браконьерства очень невысока и любительский лов ее запрещен.



Нельма

Ряпушка водится во многих бассейнах Северного Ледовитого океана, в реке Анадырь и местами на Тихоокеанском побережье Чукотки. От других сигов ее несложно отличить по форме головы — полуверхний рот и нежные беззубые челюсти делают ее похожей на селедку. На это сходство указывает и местное название ряпушки — сельдятка. Чешуя у этой рыбы крупная, серебристая и легко спадающая. Ряпушка отличается значительной экологической пластичностью и населяет водоемы самого различного типа. Полупроходные рыбы нагуливаются в лиманах и распресненных участках моря, а к осени входят в реки для нереста и зимовки. Озерноречная ряпушка летом живет в озерах и тихих протоках, а осенью выходит в основную реку. Размножение полупроходной и озерно-



Ряпушка

речной форм этого вида происходит в местах со средним течением, на песчано-галечном грунте в начале октября. Есть также озерные популяции ряпушки, весь жизненный цикл которых проходит в стоячей воде.

Питание ряпушки очень разнообразно. Она может поедать мелких рачков (зоопланктон), придонных и донных беспозвоночных (бокоплавов, моллюсков), падающих на воду насекомых и мальков рыб. Зрелые особи полупроходной формы чаще всего бывают весом от 100 до 300 граммов, реже — до 600 граммов. Быстрорастущая озерная ряпушка бывает более килограмма, но в озерах встречаются и карликовые рыбы, созревающие при весе около 20 граммов.

На спортивные снасти ряпушка ловится весьма редко, хотя численность ее в некоторых водоемах достаточно высока. Зимой и особенно весной она попадается подо льдом в среднем течении реки Анадырь — на икру или цветной поролон. Летом ряпушка может клевать также на маленькие искусственные мушки — мне неоднократно приходилось ловить ее на кораблик в реке Пучевеем (Чаунский район) вблизи устья. Признаком клева на мушку служили всплески кормящихся с поверхности воды рыб. Крупная озерная



Сиг-пыжьян

ряпушка летом и осенью попадается на переметы и закидушки, наживленные гольянами.

Очевидно, ряпушку рыболовы-любители еще не «освоили». При использовании тонкой лески, небольших крючков и подходящей наживки ее, вероятно, можно будет успешно ловить как из-подо льда, так и по открытой воде.

Сиг-пыжьян (местные названия — сиг, белорыбица, а в бассейне Анадыря — горбун) обитает в большинстве рек, впадающих в Северный Ледовитый океан (рис. 10). Кроме того, он встречается и в бассейне Тихого океана — в реках Эргувеем, Анадырь, в водоемах Беринговского района. У пыжьяна короткая голова с твердым рылом и небольшим полунижним ртом. Он может образовывать озерную и озерно-речную формы. Во время весеннего половодья заходит в затоны и протоки со слабым течением, в связанные с рекой озера. В этот период его ловят на поплавочные удочки или легкие закидушки с двумя-тремя крючками № 5—6. В качестве наживки используют кусочки рыбьего или оленьего сердца, а удастся найти — и земляных червей.



Сиг-востряк

Летом и осенью в Анадыре в районе поселка Марково сигов ловят на поплавочные удочки в ямах под обрывистыми берегами и в устьях проток, где расположены нерестилища кеты; наживкой служит икра или кусочки рыбьего сердца. С конца октября сиг клюет из-подо льда, в основном на отварную и подкрашенную в розовый цвет икру, попадается и на маленькую блесну серебристого цвета.

Сиг-востряк (см. рис. 10) встречается только в бассейнах рек Анадырь и Пенжина. Он имеет прогонистое, заметно сужающееся к хвосту тело; голова крупная, с мягким вздутым рылом и нижним ртом. Востряк — речной сиг, в значительной степени связанный с нерестилищами кеты. Он может поедать не только вымытую из гнезд икру, но и трупы погибших после нереста лососей. Этот сиг бывает весом более килограмма, ловят его так же, как и пыжьяна.

Азиатская зубатая корюшка. Корюшковые — ближайшие родственники лососевых рыб. Зубатая корюшка (зубатка) имеет только проходную форму. Нагул ее происходит в лиманах и в море, нерест — в пресной воде (в нижнем течении рек, на пес-



Зубатая корюшка

чаном дне). На материковом побережье Охотского моря крупные стада зубатой корюшки размножаются в реках Иня, Тауй, Иреть, Авекова и Пенжина. Много ее заходит и в реки Большая (Камчатка), Анадырь и Чаун. Заход из моря в лиманы и низовья рек — с середины зимы, но основная масса рыб появляется в пресной воде к началу апреля.

Зубатая корюшка достигает размеров 35 сантиметров, веса 400 граммов и больше, зрелые рыбы обычно весят от 70 до 200 граммов. Нерест происходит в период половодья — в июне. Отнерестовавшая корюшка не сразу скатывается в море и активно кормится: в этот период она может поедать значительные количества покатной молоди тихоокеанских лососей. Однажды на реке Большая мне пришлось наблюдать массовый скат мальков горбуши. Малек шел у поверхности воды, а корюшка держалась ближе ко дну, на глубине двух-трех метров. В прозрачной воде было видно, как зубатка делала бросок вертикально вверх, хватала малька и, сделав разворот, исчезала в глубине. Рыболовы знают, что при ловле на самодур или на небольшую блесну без грузила поклевку корюшки зачастую заметно по распрямлению

кивка. Вероятно, в подледный период корюшка также использует этот способ питания — бросок на добычу снизу.

Наиболее успешно рыбаки-любители ловят корюшку со льда в лиманах и устьях крупных рек, а в некоторых местах (например, в окрестностях Магадана) и непосредственно в море. На Чукотке используют удочки с кивком, блесны делают небольшие, удлиненные и довольно тяжелые, но без дополнительного грузила. Корюшковые блесны напоминают те, что применяются в водоемах средней полосы для окуня. На Охотском побережье и на западе Камчатки корюшку чаще ловят на очень легкие блесны-иголки в комбинации с тяжелым грузилом. Кивок не применяют, рыболов просто подергивает удочку (обычно ловят на две), пока не почувствует тяжесть засекшейся рыбы. Один из удобных вариантов зимней снасти: удочка длиной от 35 до 40 сантиметров с небольшой проводочной катушкой, рукоятка из пенопласта или лучше наборная из натуральной пробки. Леска диаметром 0,3 миллиметра выкрашена в черный или другой заметный на снегу цвет — окрашенную леску удобнее выбирать из воды, она меньше путается. Поводок длиной 3—4 метра и диаметром 0,2 миллиметра — голубой или зеленый. Грузило удлиненной каплевидной формы весом от 20 до 35 граммов, в него вставлена нержавеющая проволока. На заостренные концы проволоки надевают отрезки радиотехнической изоляции, через которые продет поводок. Расстояние от грузила до блесны от 0,6 до 0,8 метра. Магаданские рыболовы используют блесны, сделанные из упругой ла-



Блесны для ловли корюшки

туни или бронзы (реже — из мельхиора или нержавеющей стали) в виде загнутой иглы длиной 35—65 миллиметров и толщиной около одного миллиметра. Некоторые рыболовы к тонкому стерженьку из латуни припаивают крючок № 3,5—5, иногда со спиленной бородкой. Хорошо себя зарекомендовали и утяжеленные блесны с тонким хвостом, каплевидной головкой и припаянным крючком.

Распространенной снастью для подледной ловли корюшки является также самодур: на конце лески диаметром 0,22—0,25 миллиметра закрепляется грузило, выше него (через 25—30 сантиметров) на коротких поводках привязывают 5—8 крючков небольшого размера (№ 3—5). Наиболее уловисты никелированные крючки. И на блесны-иголки, и на крючки самодура, как правило, насаживают искусственную приманку из ниток, поролоновой губки или синтетической ткани, обычно желтого или желто-зеленого цвета. Иногда ко-



Малоротая корюшка

рюшка неплохо ловится на тот же самодур, но с насадкой кусочков корюшки.

Малоротая корюшка по сравнению с зубатой более тесно связана с пресными водоемами, она образует не только проходную, но и жилую форму. Морская малоротая корюшка обычно мельче зубатой: длина ее чаще 12—17 сантиметров и вес от 20 до 50 граммов. Малоротая корюшка ловится на те же снасти, что и зубатая, но на самодур с мелкими крючками попадается чаще, чем на блесны. В районе Магадана малоротую корюшку ловят в реках Армань, Ойра и Яна возле самого впадения их в море, очень хорошо крупная малоротая корюшка клюет в Иретском лимане в районе поселка Тахтоямск. Постоянно обитающая в тундровых озерах жилая малоротая корюшка существенно мельче проходной. Так, в озере Чистое средняя длина зрелых рыб 7—8 сантиметров, в озере Пареньское — 6—7, в озере Чукча — от 4 до 5. Жилая корюшка не имеет промыслового значения, но является важным кормовым объектом (и прекрасной наживкой) для обитающих в озерах крупных рыб — гольца, кунджи, хариуса, щуки и налима.

Щука обитает в бассейнах рек Колыма,

Щука

Анадырь, Пенжина, Парень и Гижига, на севере Камчатки. В реках щука придерживается участков с замедленным течением, охотно заселяет не слишком холодные озера. Типичные для Охотского побережья участки рек с быстрым течением и крупногалечным грунтом непригодны для этого вида. Так, щуку не встретишь в верховьях и среднем течении реки Парень, хотя в некоторых озерах этого бассейна она очень многочисленна. В больших реках (как в притоке Анадыря реке Майн) водятся очень крупные щуки — весом до 12—15 килограммов. Такая рыбина может проглотить даже средней величины кету.

Щуку у нас ловят исключительно на блесну, живцовые снасти (кружки и жерлицы) не применяют. При ловле на спиннинг используют крупные колеблющиеся блесны, хорошо берет щука на плавающий воблер и на приманки типа искусственной мыши. Зимой щуку ловят на ныряющие блесны, применяют летние колеблющиеся блесны удлиненной формы.

Елец — эта широко распространенная в Европе и Сибири рыба у нас водится только в Колыме, на участке вниз от поселка Сеймчан. Ловят ельца на поплавочные удочки в проводку.

1/3 Заказ № 676



Елец

Окунь на территории Магаданской области встречается только в верховьях Колымы, да и то не слишком часто. Известно, что в большинстве водохранилищ, построенных на сибирских реках, окунь сейчас — один из



Окунь

наиболее массовых видов рыб. Возможно, и в Колымском водохранилище после его окончательного заполнения (если не помешает загрязнение воды) эта рыба найдет себе благоприятные условия для жизни.

Налим распространен на Северо-Востоке шире щуки, он отсутствует только на Камчатском полуострове и в большинстве рек материкового побережья Охотского моря (есть



Налим

в Гижиге, Парени и Пенжине). Налим населяет не только реки, но и многие незаморные озера. В период открытой воды эту рыбу ловят в основном на донки или закидушки с наживкой из кусочков рыбы или гольянов, зимой — на оставляемые в лунках куски толстой лески с грузилом и наживкой. Вырубать вмерзшие в лед лески очень трудно, гораздо проще при проверке снасти каждый раз сверлить рядом другую лунку и через нее доставать леску с помощью крючка из стальной проволоки.

Указанные способы лова не являются спортивными — рыболов оставляет снасти на ночь, а наутро снимает попавшуюся рыбу. Не



Способ проводки налимьей донки

Все знают, что налима можно ловить и вполне спортивными способами, правда, в сумерках или ночью. По открытой воде используют ходовую донку с утяжеленной оснасткой, рассчитанной на ловлю в глубоких местах с неровным дном. Ловят спиннинговым удилищем с катушкой, оснащенной леской диаметром 0,4—0,6 миллиметра. На конце лески закрепляется тяжелое грузило (25—40 граммов), над ним привязывают один или два поводка диаметром 0,35—0,5 миллиметра с одинарными крючками № 8,5—12. Наживка должна перемещаться по дну медленно, с остановками до минуты. Лучший клев обычно бывает вечером — до 24 часов.

Со льда налима можно ловить на крупную мормышку или блесну — обязательно с насадкой. Удачным бывает использование крупных спиннинговых колеблющихся блесен, только тройник необходимо заменить прочным одинарным крючком № 12—18, на который насаживается кусок свежей рыбы. Приманку подергивают таким образом, чтобы в паузах она касалась дна. Поклевка налима может ощущаться как зацеп, но обычно чувствуется толчок в момент хватки рыбы.

Часть 2

СНАСТИ И СПОСОБЫ ЛОВА

Спиннинг. Правильно устроенным спиннингом с соответствующей блесной можно ловить многих наших рыб. Существенно расширяет сферу применения этой снасти возможность использования ее в качестве ходовой донки, для проводки с поплавком, а также для ловли на искусственную мушку. В наших условиях необходимо прочное, не слишком гибкое удилище достаточной длины. Имеющиеся в продаже короткие одноручные удилища дают возможность ловить хариусов и некрупных гольцов, но они малопригодны даже для горбуши, не говоря уже о более крупных рыбах. Слишком мягкое удилище не позволяет далеко забросить тяжелую приманку, произвести достаточно мощную подсечку, особенно если рыба взяла блесну вдалеке от рыболова. Двуручное удилище длиной 2,0—2,3 метра с рукояткой в 60—65 сантиметров наиболее универсально, оно дает возможность ловить с открытых и заросших берегов, а также с лодки. Длинные двуручные удилища (2,4—2,8 метра) хороши для ловли крупной рыбы с открытого берега. Двуручным удилищем по сравнению с одноручным можно ловить длительное время, не утомляясь, облегчается и вываживание крупной добычи. Еще одно существенное преимущество двуручного спиннинга: при забросах с инерционной ка-

тушкой бывает намного меньше случаев запутывания лески, так как при этом правая рука почти не напряжена, что дает возможность точнее притормаживать барабан катушки.

Автор уже много лет использует одно и то же удилище для ловли самых разных рыб — от хариуса до чавычи. Это двуручное самодельное удилище длиной 220 сантиметров составлено из двух колен. Верхнее колено — сплошное из стеклопластика (диаметр вверху 4,3 миллиметра, а у соединительной трубки — 10 миллиметров) оснащено четырьмя стальными пропускными кольцами и тюльпаном. Нижнее колено (диаметр его вверху 12 миллиметров, внизу 20 миллиметров) с одним пропускным кольцом — трубчатое, дюралюминиевое, рукоятка наборная из натуральной пробки длиной 60 сантиметров.

Оценить, достаточна ли мощность и жесткость удилища для ловли лососей (кижуча, кеты и горбуши), несложно: нужно закрепить его рукоятку горизонтально, а к тюльпану подвесить груз весом 500 граммов. Удилище нормальной жесткости длиной около двух метров должно иметь прогиб (от горизонтали) около 40 сантиметров, а при длине 2,5 метра — до 60 сантиметров. (Здесь я не касаюсь проблем строя удилища, подробно рассмотренных в руководствах по спиннингу.)

Для ловли средней и крупной рыбы удобна инерционная катушка «Невская» — у нее достаточно легкий ход, что позволяет использовать длинную леску значительного диаметра. Безынерционные катушки отечественного производства имеют слишком малый объем шпули и не могут применяться с леской толще 0,4 миллиметра. Кроме того, инерционная катушка дает возможность почувствовать самую слабую поклевку — леска при подмотке идет через пальцы.

Лососевые рыбы оказывают при вываживании значительное сопротивление, поэтому прочность лески должна не менее чем вдвое превосходить вес возможной добычи. Очень важно уметь подобрать гармоничную снасть — ее элементы должны иметь сравнимую прочность и жесткость. Так, на мощное удилище нельзя ставить тонкую леску, маленькие слабые тройники. Необходимо также проверять прочность заводных колец и вертлюжков — она должна быть несколько больше, чем у лески.

Рыболовов интересуют вопросы: как правильно выбрать приманку? какая блесна лучше? Есть мастера, делающие блесны настолько похожими на настоящую рыбку, что просто диву даешься. Между тем такие приманки, по многим наблюдениям, не имеют преимуществ перед старыми, испытанными моделями очень простых очертаний. Более того, овальный однотонный кусок металла зачастую сильнее привлекает хищника, чем живой малек на крючке. Почему? Частично ответить на эти вопросы могут работы этологов — ученых, изучающих поведение животных.

Самец трехиглой колюшки во время нереста охраняет свой участок с гнездом, нападая на других заплывающих сюда самцов. У самцов (но не у самок) колюшки брюшко в это время красное, и потому основным сигналом для нападения является красный цвет брюшка противника. Вот почему упрощенные,

мало похожие на рыбку модели с красным брюшком вызывают гораздо более ожесточенные атаки самца, чем модели, точно имитирующие колюшку, но без красной окраски. Таким образом, «красное пятно снизу» — основной раздражитель, остальные внешние признаки модели имеют для колюшки лишь второстепенное значение.

Если в модели сконцентрированы именно те особенности естественного объекта, которые важны для вызывания реакции, то может возникать так называемая сверхнормальная реакция. На такую модель рыба реагирует сильнее, чем на соответствующий естественный объект. Все сказанное, конечно, относится не только к блеснам, но и к другим искусственным приманкам, в том числе к мушкам, мормышкам...

Теперь становится ясно, что попытки сделать искусственную рыбку под «настоящую» — бессмысленны. Гораздо больший эффект имеет приманка, объединяющая в себе те признаки, что «ждет» сейчас хищник (и лучше, если в несколько усиленной, утрированной форме). К важным признакам добычи относятся прежде всего размер, окраска и характер движений. Например, если основной пищей хищников в данном озере является малоротая корюшка, то нужно использовать удлиненные узкие колеблющиеся приманки серебристого (белого) цвета. Средний и крупный хариус в конце лета и осенью хорошо ловится на неполированные медные или латунные вращающиеся блесны, если их вести в небыстром темпе почти по дну. Вероятно, такие приманки напоминают хариусу его излюбленный корм — бычка-подкаменщика. Тихоокеанских лососей в реках больше всего «раздражают» крупные яркие блесны, идущие у самого дна уступами: такие приманки, возможно, им напоминают мелкого гольца-икроеда. Если же блесна движется слишком быстро или хотя бы на метр выше дна, хватки лососей будут намного реже.

При выборе приманок нужно учитывать индивидуальные особенности различных видов рыб, а также специфику данного места лова и сезона. Так, горбуша охотно берет колеблющиеся блесны и реже — вращающиеся; чавычу, напротив, ловят исключительно на вращающиеся. Хотя хариусу больше «нравятся» тусклые медные блесны, при незначительном помутнении воды он чаще попадается на более заметные белые — из полированного металла. Мне кажется, в наших условиях совершенно не нужно брать на рыбалку множество типов блесен, гораздо важнее иметь всегда при себе приманки разного веса, размера и цвета.

Из колеблющихся приманок для речной ловли мы обычно применяем крупные или среднего размера (65—100 миллиметров) и довольно тяжелые (толщина 2—3 миллиметра) — «шторлек», «атом», «волна» и им подобные. Наиболее универсальны белые блесны без зеркального блеска, реже (обычно для ловли в очень чистой воде) бывают нужны латунные, медные или эмалированные. Очень важно, чтобы блесна даже на быстром течении не переходила во вращение, а давала бы интенсивные колебания в ту и другую стороны. Для этого пластинка блесны должна

быть симметричной, не слишком круто изогнутой и неширокой: отношение длины к ширине не менее 3,5:1. В озерах лучше ловить на интенсивно играющие приманки из металла толщиной 1,5—2,0 миллиметра. У мелких колеблющихся блесен в наших условиях обычно нет преимуществ перед вращающимися.

Если часть моделей имеющихся в продаже колеблющихся блесен вполне пригодны для практической ловли, то вращающиеся обычно приходится изготовлять самим. Правда, в последнее время в магазинах появились неплохие копии импортных блесен, изготовленные кооператорами.

Я использую для ловли самых разных рыб самодельные блесны практически одной конструкции (рис. 11), изменяя только их размеры и цвет. Лепесток блесны делают из меди, латуни, мельхиора или биметалла (никелированной латуни). Для мелких приманок толщина металла должна быть порядка 0,5 миллиметра, для блесен средней величины (длина лепестка 30—40 миллиметров) от 0,6 до 0,7 миллиметра и для крупных — до 1 миллиметра. Слишком тонкие лепестки работают ненадежно, особенно в местах без течения. Выпуклость лепесткам можно придать путем штамповки или слегка изогнув их вдоль длинной оси. Форма лепестков чаще бывает овальная или каплевидная, реже — многоугольная, длина обычно в два-три раза больше ширины. К стержню блесны лепестки крепятся с помощью подвески из тонкой упругой нержавеющей проволоки или полоски металла. Если уменьшить прогиб (выпуклость) лепестка, он начинает вращаться с большей скоростью, а размах (отход от оси вращения) увеличивается. Напротив, более выпуклая блесна вращается медленнее и близко прижимается к стержню. Изменяя выпуклость лепестка приманки, можно на месте ловли окончательно отрегулировать ее. Чаще рыба «предпочитает» интенсивно играющую блесну с небольшим размахом — отход лепестка от стержня не должен превышать 30 градусов. При вялом клеве хариуса лучшие результаты дают приманки с малоподвижными, медленно вращающимися лепестками: такие блесны в воде делают обороты то в одну, то в другую сторону и несколько напоминают колеблющиеся.

В качестве стержня блесны желательно использовать безопасные (английские) булавки: обычная стальная проволока быстро ржавеет. Вертлюжок к стержню крепится жестко — пайкой. Бусинки не только помогают вращению лепестка, но и привлекают рыбу, поэтому лучше, если они яркие (красные, оранжевые) и довольно крупные. Застежку для тройника можно делать как на фабричных блеснах или же использовать трубочку — кембрик из толстого электропровода. На цевье тройника нужно надеть резиновую или мягкую пластмассовую трубочку, которая затем сдвигается на застежку. Эта трубочка уменьшает вероятность захлеста тройника за леску во время заброса. Важный элемент оснастки блесны — оперение тройника. Его делают из цветных ниток, тонких полосок мелкого пластика или птичьих перьев. Крупные лососевые блесны оснащают тройником с красно-синим оперением. Для хариуса привлекательнее рыжие

или крапчатые птичьи перья. Между лепестком и остриями тройника должен быть зазор не менее 5 миллиметров.

Легкие вращающиеся блесны применяют с грузилом, установленным на леску на расстоянии 30—60 сантиметров. Закрепить грузило типа «оливка» можно, продев леску в его отверстие 3—4 раза. Очень удобны самодельные свинцовые грузила в форме плоского треугольника с отверстием вдоль одной из сторон. Такое грузило предохраняет леску от закручивания. Закрепляют его так же, как «оливку». Набор из десятка таких грузил весом от 5 до 20 граммов позволяет ловить в водоемах самого различного типа.

Интересна так называемая камчатская оснастка: основная леска привязывается к середине коромысла из стальной проволоки в форме буквы V, а к его концам — 2 поводка. На более короткий поводок длиной 30—50 сантиметров ставят грузило в виде капли или стержня весом 30—50 граммов и даже больше — в зависимости от глубины и скорости течения. Второй поводок делают вдвое длинней, облегченная вращающаяся блесна (без подгрузка) привязывается к его концу. Такой снастью ловят примерно так же, как ходовой донкой,— грузило ведут по дну или около него. На сильном течении снасть сносит по дуге почти без подмотки, а блесна играет у дна. Одно из преимуществ камчатской оснастки — меньшее число зацепов. С грузилом на отдельном поводке можно ловить и в мелких речках, и в озерах, но особенно ярко достоинства этого способа проявляются на глубоких местах с быстрым течением.

Есть вращающиеся блесны с подгрузком, который закреплен на стержне ниже лепестка. Если же грузик (чаще треугольной формы) поставить перед лепестком, получается приманка с грузом-головкой. Блесны с подгрузками используют без дополнительного грузила, заброс производится с помощью безынерционной катушки.

Хочется сказать несколько слов о группе спиннинговых приманок, принципиально отличающихся от блесен. Это воблеры — деревянные или пластиковые приманки, изображающие (почти всегда) рыбку. В Магаданской области и на Камчатке их практически не применяют, а зря — это высокоспортивная и уловистая приманка. За последние годы появилось немало публикаций о воблерах, что свидетельствует о возрастающем внимании к ним рыболовов-любителей. По сравнению с блесной воблер — менее универсальная приманка, большинство моделей рассчитаны на лов в определенном диапазоне глубин и скорости течения, но во многих случаях лов на воблер гораздо результативнее.

При самостоятельном изготовлении воблеров следует иметь в виду, что при проводке в воде они должны устойчиво идти с поперечными колебаниями или рыскать из стороны в сторону, но не вращаться по спирали и не переворачиваться брюхом кверху. Как правило, в регулировке нуждаются и купленные в магазине приманки типа «Орено» или «Балтика». Подробные описания и чертежи разнообразных воблеров можно найти, например, в альманахе «Рыболов-спортсмен» № 41 за 1981 год.

Поплавочная удочка. Для ходовой ловли хариуса, мальмы и кунджи в реках применяют удилища длиной 4—4,5 метра. Бегучая оснастка с катушкой и кольцами создает заметные преимущества перед «глухой» при ловле осторожной рыбы на значительном расстоянии от берега, а также при вытаскивании крупной добычи. Удилище не должно быть грубым или излишне тонким и гибким. Особенно удобны и транспортабельны телескопические удилища из стекло- или углепластика. Пропускные кольца должны соответствовать используемой катушке. Наиболее употребимы в наших условиях безынерционные катушки открытого типа. Из отечественных моделей надежными и вполне пригодными для практической ловли являются катушки серии ЛЭМЗ, а также «Орион». Леска используется диаметром от 0,2 до 0,3 миллиметра, редко более толстая. Поводок не обязателен, многие обходятся без него, привязывая крючок прямо к основной леске. Поводок (на 0,02—0,05 миллиметра тоньше основной лески) необходим при ловле в незнакомых местах и там, где много зацепов,— лучше оторвать только крючок, чем всю оснастку. Удобнее всего ниже грузила завязать на леске петлю, а за нее затяжным узлом крепить поводок.

Для ловли в проводку у нас применяют самодельные поплавки сигарообразной формы длиной 6—9 и толщиной 1—2 сантиметра из пробки или пенопласта. По оси поплавка отверстие, в которое вставляется стержень — антенна из дерева или птичьего пера. Закреплять поплавок на леске можно по-разному.



Поплавки

Проще всего просверлить его по оси, продеть леску в отверстие и зажать антенной. Можно также на ватерлинии поплавка закрепить проволочную петельку, а нижний конец антенны вставить в надетую на леску резиновую или пластиковую трубочку. При ловле в проводку осенью и зимой (при отрицательной температуре воздуха) лучше надеть на леску две трубочки и вставить в них концы антенны — так легче держать леску в воздухе, не обмакивая ее в воду. Для ловли карликовой мальмы и хариуса в ручьях используют небольшие поплавки (длиной 2,5—4 сантиметра) неяркой окраски. Необходимо, чтобы поплавок был правильно огружен и выступал из воды не более, чем на одну пятую своей длины.

Хариуса и среднего размера мальму обычно ловят на крючки № 6 и 7. Проводочную удочку оснащают различными способами (рис. 12). Самая простая оснастка состоит из грузила и одного крючка или мормышки. Можно так-

же привязать второй крючок на дополнительном поводке или же ловить одновременно на крючок и мормышку. Иногда успех приносит замена крючка легкой блесенкой из тонкого металла. Некоторые рыболовы ставят выше крючка поводок с искусственной мушкой светлой расцветки, лучше желтой или розовой. Эта дополнительная приманка зачастую намного увеличивает количество поклевок.

Ловля в проводку не простое дело: нужно знать повадки рыбы, уметь «читать реку». Очень важна правильная установка глубины — наживка, как правило, должна идти близко ко дну. Течение у дна слабее, чем в толще воды, поэтому свободно пущенный поплавок обгоняет крючок. Чтобы крючок с наживкой плыл впереди грузила, поплавок следует слегка придерживать, натягивая или подергивая леску; этим же достигается и шевеление наживки, что активизирует клев. Подергивание снасти особенно важно при использовании вместо крючка мормышки или легкой блесенки. Иногда при плохом клеве мальмы успех приносит вот такая оснастка поплавочной удочки: грузило ставят на конце лески, а в 10 сантиметрах выше него на поводке длиной 30—40 сантиметров привязывают крючок.

Магаданские рыболовы используют длинное удилище с катушкой как универсальную снасть: меняя оснастку, можно ловить в проводку или ходовой донкой, на искусственные мушки (поверху или у дна), на «мышь» или небольшую спиннинговую блесну, а также на чукотскую блесну. Различные оснастки (поплавочные, донные, верховые с мушками)

можно разместить на отдельных отрезках лески длиной 2,5—4 метра. Такой набор не занимает много места, на рыбалке достаточно иметь с собой одно удилище с катушкой, а оснастки заменять в процессе ловли. Оснастку можно закреплять затяжным узлом за петлю на конце основной лески.

Ходовая донка. Эта снасть появилась на Северо-Востоке не так давно, но быстро распространяется среди рыболовов. Для ловли донкой обычно используют короткое спиннинговое удилище. Мне кажется, удобнее всего применять легкий и гибкий двуручный спиннинг длиной 2,7—3 метра или четырехметровое телескопическое удилище с безынерционной катушкой. Особенно хороши скоростные катушки, выбирающие за оборот рукоятки не менее 70 сантиметров лески. Для ловли мальмы и харпуса обычно используют основную леску диаметром 0,3—0,35 миллиметра, на конце снасти закрепляют грузило, а над ним — несколько поводков с крючками № 5—7. Ставить на донку по примеру некоторых рыболовов по 3—5 крючков не следует: снасть становится неудобной, путается, чаще случаются «мертвые» зацепы. Я обычно использую такую оснастку: основная леска (0,3 миллиметра) с одним поводком (0,25 миллиметра) длиной около 20 сантиметров. Поводок закрепляется затяжным узлом за петлю, завязанную в 70 сантиметрах выше грузила. Грузило в виде стержня из свинца длиной 40—70 миллиметров и толщиной 4—6 миллиметров. Для ловли на тихом течении хороши грузила из медной или железной проволоки диаметром 2,5—5, длиной — 80—

140 миллиметров. Удлиненные грузила в отличие от стандартных спиннинговых мягко идут по дну, не мешают чувствовать поклевки и реже застревают между камнями. На конце грузила нужно просверлить отверстие, в которое продевается короткий (5—10 сантиметров) поводок в виде петли из толстой лески или капроновой нити. Этот поводок — важный элемент оснастки: если привязать тонкую леску непосредственно к грузилу, она быстро перетрется о камни. Вместо крючков можно ставить на донку легкие блесенки или пластмассовые мормышки: в некоторые дни это заметно увеличивает количество поклевок. Использовать свинцовые мормышки не следует: они идут по дну, что приводит к частым зацепам за камни.

На ловлю необходимо брать несколько готовых оснасток с крючками разного размера, а также запасные грузила различного веса — от 5 до 40 граммов. Стандартные спиннинговые грузила во многих случаях оказываются слишком тяжелыми и волочатся по дну, вместо того чтобы идти на «отрыве». Наживки используются те же, что и при ловле на поплавочную удочку (они, разумеется, должны хорошо держаться на крючке и не слетать при дальних забросах). Лучшая наживка для донки — лососевая икра, завязанная в кусочки капронового чулка — тампоны. Тампоны можно делать из сырой (соленой) икры по 3—5 штук или из отварной — по 1—2 штуки. При активном клеве я, например, ловлю на тампоны с отварной икрой, выдерживающие свыше десяти поклевок. При более вялом клеве можно ловить на тампоны из сырой

икры, правда, на эту наживку трудно поймать больше одной рыбы.

Первые забросы следует делать не более 10 метров от берега, затем можно обловить и расположенные дальше участки реки. Забросы делают поперек реки или наискосок вверх — против течения. Во втором случае нужно успевать подбирать леску, пока приманка не пройдет мимо рыболова. Удлинить проплыв наживки можно, сдавая леску с катушки. Чтобы легкое грузило достигало дна, иногда приходится выпускать с катушки излишек лески, который на течении идет впереди наживки в виде дуги. Изменяя длину лески и ее натяжение, можно управлять ходом приманки.

Поклевка ощущается по удилищу, которое обычно держат под углом к леске. Мне кажется, удилище лучше держать горизонтально, а леску пропускать через пальцы правой руки (левая работает с катушкой). При вялом клеве бывает трудно уловить момент подсечки. Мелкую рыбу на донку ловить труднее, чем на снасть с поплавком, зато чаще попадаются крупные экземпляры. Зачастую (разумеется, при очень острых крючках и легком грузиле) подсечки не требуется: рыба берет сносимую течением наживку, и плывущая впереди крючков петля лески засекает ее. Именно поэтому при ловле на ходовую донку и в проводку нельзя прятать жало крючка в наживке.

Вместо крючков на ходовую донку можно ставить искусственные мушки крупных размеров. Ловят на мушки примерно так же, как на наживку, но удилище держат круче, про-

водя приманки и у дна, и в толще воды. Этим способом можно ловить хариуса и ленка — осенью, а мальму также и весной, до сильного помутнения воды.

Искусственные мушки. Об искусственных мушках написано множество книг, первая из них вышла в Англии около 300 лет назад. Одни мушки копируют насекомых или мальков, другие являются фантазийными, то есть не имеют реального прототипа в природе. Некоторые рыболовы создают огромные арсеналы разнообразнейших мушек. На водоеме таких легко узнать — после нескольких забросов они меняют приманку, «предлагая» рыбам все новые образцы своего творчества. Другие всегда и всюду ловят на одну и ту же мушку, например, на клочок собственной рыжей бороды. Такие «однолюбы» меняют приманку только в одном случае — если у нее ломается крючок. Правильный подход, вероятно, нужно искать где-то между этими крайними вариантами.

Как же заставить рыбу схватить мушку? Нужно стараться вызвать у нее сверхнормальную реакцию (см. «Спиннинг»), а именно: приманка должна в несколько утрированной форме объединять в себе важнейшие признаки самой привычной в данное время добычи — насекомого или малька. Особенно важно точно имитировать такие признаки ее, как цвет, размеры и общие очертания, характер движений. Иногда (к примеру, во время вылета поденки) река бывает просто покрыта насекомыми, но клев на мушку при таком изобилии пищи не только не ослабевает, а иногда даже усиливается. Видимо, хорошо

сделанная и правильно поданная приманка больше возбуждает рыбу, чем естественное насекомое.

Правда, вызвать хватку рыбы — только полдела. Нужно еще, чтобы крючок приманки имел подходящие размеры, необходимую остроту и прочность, правильный угол установки жала. Много пустых поклевок бывает и при использовании слишком пышных мушек, особенно если они сделаны не из мягких перьев, а из шерсти.

На Северо-Востоке до сих пор неизвестен классический нахлыст — со специальным коротким удилищем и конической леской. Основная причина этого — отсутствие в продаже нахлыстовой снасти. Настоящих сухих мушек, отличающихся богатым оперением, подвергающихся специальной пропитке водоотталкивающими веществами (отчего после заброса они держатся на поверхности воды), у нас не применяют. Все приманки, на которые я ловлю сам, все, что видел у других рыболовов,— типичные мокрые мушки со скупым, зачастую прижатым к тельцу или укороченным оперением. При ловле они держатся на поверхности воды (когда это нужно) за счет особенностей используемых снастей. Эти же мушки ставят и на кораблик (см. с. 93).

Блесны можно купить в магазине и успешно ловить на них, мушки же приходится изготовлять самостоятельно. То, что выпускает промышленность (полиэтиленовые мухи, слепни и кузнечики, мухи из крашеных куриных перьев или с крыльями из кожзаменителя), рыба пока «не оценила». Одни рыболовы делают мушки в основном из перьев и ниток,



Форма крючков для мушек

другие — из меха. Мне меховые приманки кажутся слишком жесткими, но это, конечно, дело вкуса.

Лучшие перья для мушек — с шеи рыжего петуха, используют также перья куропатки, диких уток и куликов. Подробное описание процесса изготовления разнообразных мушек можно найти в специальной литературе по спортивному рыболовству. Я остановлюсь на особенностях приманок, уловистых в наших условиях.

Практически все типы фабричных крючков нуждаются в доработке. Для мушек нужны крючки с прямым загибом и достаточно длинным цевьем, оканчивающимся колечком. Крючки с лопаточкой тоже можно использовать, но поводок к ним привязывается до изготовления мушки. Цевье крючка изгибают, придавая одну из изображенных на рисунке

форм. Используемые в некоторых случаях двойные крючки № 4—7 с длинным цевьем в продаже не бывают, их приходится изготавливать самостоятельно. Угол между плоскостями крючков должен быть не 120°, как у фабричных двойников, а от 45 до 60 градусов. Кроме изменения формы крючков, их обычно нужно затачивать, устранять заусеницы на острие и бородке. Мелкие тройники № 3,5—5 используют для изготовления трубчатых мушек, можно также делать мушки непосредственно на цевье тройника. Тройники приходится изготавливать самостоятельно из прочных крючков с длинным цевьем и без бокового загиба. Мушки, связанные на тройниках, очень уловисты за счет меньшего количества пустых поклевок. С другой стороны, крупную рыбу на них вытащить труднее — она часто ломает небольшие крючки тройника.

Легкие мушки, предназначенные для ловли у поверхности воды, обычно вяжут на крючках № 4—7. Оперение мушки играет роль киля: от его размера и места установки зависит положение крючка при проводке приманки в воде. Тело легких мушек наматывают из ниток, иногда с подкладкой из натуральной пробки для плавучести. Тельце мушки из ниток двух разных цветов или украшенное блестящим люрексом лучше заметно в воде, особенно при плохой освещенности. Жабо (пучок щетинок у колечка крючка) обычно делают из шейного пера петуха. Крылья мушек можно подобрать из отдельных мелких перышек или же из пучков бородок от крупных перьев (рис. 13).

Порядок изготовления мушки таков (описывается сложная конструкция с большим количеством деталей).

1. Подготовить (изменить форму) и заточить крючок. Если крючок с лопаточкой, привязать поводок. Крючок за острие закрепить в тисочках.

2. Смазать цевье крючка клеем БФ-2, закрепить тонкую (№ 65—80) шелковую или капроновую нитку.

3. Этой ниткой примотать у изгиба крючка хвостовые щетинки, нить люрекса и шерстяную или шелковую нитку для тела мушки.

4. Намотать тело, закрепить конец толстой нити у колечка крючка (тонкой ниткой с клеем).

5. Обмотать тело по спирали нитью люрекса, закрепить ее конец у колечка крючка.

6. Здесь же примотать петушиное перо для жабо.

7. Обкрутить петушиное перо вокруг передней части приманки, чуть отступая от колечка, чтобы оставить место для крыльев.

8. Закрепить конец петушиного пера тонкой ниткой с клеем, обрезать лишнее. Здесь же установить и примотать одно или два мягких перышка или пучок бородок от крупного пера, изображающие крылья.

9. Из тонкой нитки намотать головку, несколькими петлями закрепить нитку, проклеить.

В результате получается мушка, изображенная на рис. 13, *б*. При самостоятельном изготовлении рыболовы зачастую допускают ошибку, делая мушки слишком пышными. Рыба к таким приманкам относится с подозрением, да и подсечка не всегда получается.

Наиболее универсальным цветом легких мушек является рыжий — ловлю в незнакомых местах следует начинать именно с таких приманок. Белые, желтые и бледно-розовые мушки хороши в сумерках, а черные — в солнечную погоду, а также в середине лета — в период появления крылатых муравьев. Набор, позволяющий ловить различных рыб в течение всего сезона, может состоять примерно из 20 приманок:

1. На крючке № 4: рыжая, черная, коричневая.

2. На крючке № 5: белая или бледно-серая, рыжая, черно-желтая, красно-золотистая, серебристая с крапчатыми крыльями, красно-бурая, оливковая.

3. На крючке № 6: рыжая, черная, коричневая, серебристая с серыми крыльями, красно-бурая, оранжево-золотистая, медно-красная.

4. На крючке № 7: рыжая, серебристая, оливковая.

Для изготовления утяжеленных мушек (рис. 14) используют крючки с напайкой олова, можно также обматывать цевье свинцовой ленточкой с клеем. Приманки для осенней ловли хариуса и ленка вяжут так же, как легкие хариусовые, но на утяжеленных крючках более крупного размера — № 6—10. Для ловли у дна мушки должны быть достаточно яркими, тело их обычно делают двухцветным. Иногда тело утяжеленных мушек покрывают серебристой или окрашенной фольгой. Такие приманки могут изображать не только насекомых, но и мальков, и в этом случае изго-

тавливаются с прижатым к телу оперением черного, серого или голубоватого цвета. Мушки «под малька» с серебристой фольгой результативны при ловле речной мальмы, а окрашенная фольга привлекает крупного хариуса и микижу. Самые яркие мушки нужны для ловли в мутноватой воде. Леску к приманкам всех типов привязывают с помощью затяжного узла. Трубчатые мушки (рис. 14, *г*) вяжут на тонкой металлической или пластмассовой трубочке. На леску с помощью иглы надевается изображающий головку круглый или цилиндрический кусочек микропористой резины, затем трубочка-мушка, бусинка и потом привязывается тройник. Трубочка опускается до тройника и удерживается возле него стопором из резины.

Оснащать удочку мушками можно по-разному. Если нет необходимости в далеком забросе, можно одну приманку ставить на конце основной лески, а другую (меньших размеров) в 25—30 сантиметрах от нее на 10-сантиметровом поводке. Появившиеся в продаже длинные телескопические удилища позволяют забросить такую оснастку на 9—10 метров, а с подветренного берега — еще дальше. При ловле на неглубоких реках можно зайти на перекат и пускать мушки по течению, на больших водоемах удобно использовать поставленную на якорь или свободно плывущую лодку.

Если необходим далекий заброс, обычно применяют достаточно мощное удилище длиной 4—5 метров и утяжеленный поплавок-торпеду (сигарообразный кусок пенопласта с вклеенным в него грузилом весом от 7 до

25 граммов). Можно также использовать имеющийся в продаже поплавок-груз — полый прозрачный шарик, который во время ловли частично заполняют водой. Выше поплавка я обычно ставлю 2—3 мушки (не более) на поводках длиной 15—25 сантиметров. Поводки закрепляются затяжным узлом (рис. 15, *б*) за петлю, завязанную на основной леске (рис. 15, *в*). Расстояние от поплавка до первой приманки около метра, следующие ставятся через 50—60 сантиметров. Если условия ловли позволяют, на полуметровом поводке ниже поплавка можно поставить утяжеленную или трубчатую мушку.

Сделав заброс (удобнее применять скоростные безынерционные катушки с передаточным числом редуктора около 1:5), рыболов ставит удилище вертикально и, подматывая леску, ведет мушки по поверхности воды. Иногда одну-две мушки на поводках ставят на обычную поплавочную оснастку (для ловли на наживку) выше поплавка. Такая снасть не очень удобна, но позволяет быстро оценить ситуацию на незнакомом водоеме и выяснить, на что лучше ловить. Реже используется оснастка с одной легкой мушкой на конце лески и поплавком в двух и более метрах от нее.

На верховую мушку рыба лучше клюет летом и осенью в теплую погоду. Признаком клева служат всплески — «игра» рыбы. Если же рыба стоит в глубине и не поднимается к поверхности (это часто бывает осенью, когда вода теплее воздуха), лучше ловить на затонувшую мушку. Для этой ловли удобно длинное удилище и леска с привязанной круп-

ной (обычно яркой) мушкой на длинном крючке. В полуметре от мушки можно закрепить дополнительное грузило из нескольких дробинок. Вес грузила зависит от глубины и скорости течения — приманка не должна волочиться по дну. В метре выше грузила можно закрепить поводок с дополнительной мушкой меньшего размера. Принцип этой ловли напоминает ходовую донку, но забросы делаются на небольшое расстояние — до трех длин удилища. Приманку забрасывают выше себя, дают ей погрузиться и ведут поперек струи, не поднимая к поверхности воды. Если необходимо провести мокрые мушки вдали от берега, лучше использовать обычную оснастку ходовой донки — с поводками, привязанными выше грузила. В ручьях и небольших речках мокрые мушки удобно применять с такой оснасткой: на конце лески легкое грузило (картечина), выше — два недлинных поводка (поплавка нет). Такой снастью облавливают ямки и другие места стоянки рыбы, как бы прощупывая дно вниз по течению.

Успешная ловля на мушку требует от рыболова наблюдательности, а также некоторых познаний в энтомологии. Нужно представлять себе, какие насекомые или их личинки доступны для рыб в данное время, не пропускать массового появления поденок или крылатых муравьев-древоточцев. Иногда кажется, что в природе за ночь будто бы ничего не изменилось: нет признаков ухудшения погоды, рыба никуда не ушла, но «работавшие» вчера мушки она словно не замечает. Вполне возможно, что просто начался вылет каких-

либо насекомых, и рыба «переключилась» на более доступный корм. Хороший способ выяснить, на что сейчас будет брать рыба,— исхитриться и поймать хотя бы одну и посмотреть, что у нее в желудке. При некотором навыке можно прямо на берегу связать уловистую мушку. При этом, как уже говорилось, нужно делать не портрет привлекательного для рыбы существа, а «дружеский шарж» на него.

Очень важно бывает, например, понять, с поверхности сегодня кормится рыба или под поверхностью. Во втором случае всплески рыб будут беззвучными, без брызг и выглядят как маленькие водовороты. В такие дни нужно предлагать рыбе слегка затонувшую мушку, проводя ее в 2—5 сантиметрах под поверхностью воды. Поклевка на верховую мушку заметна по всплеску: находящуюся под поверхностью воды приманку рыба чаще берет беззвучно, но обычно показывает спину или хвост. При ведении приманки в толще воды или у дна хватка ощущается как стук или легкий толчок. Во всех случаях подсечку нужно делать четко, без опоздания и не слишком сильно.

Кораблик. Иногда эту снасть называют «водяной змей» или «санки». Кораблик давно известен в Сибири и на Дальнем Востоке, его используют многие рыболовы. Первоначальный вариант этой снасти напоминал обыкновенный плоский воздушный змей — утяжеленная с одной стороны прямоугольная дощечка с четырьмя веревочками по углам. Сейчас обычно используют двухкорпусные кораблики-катамараны, которые гораздо ус-



Подвеска мушек к леске

тойчивее на волне и легче управляются.

Начинающие рыболовы стараются поставить на кораблик побольше мушек. Это неправильно, так как снасть становится громоздкой и неудобной, легко запутывается. Я же беру с собой две оснастки для кораблика на отдельных мотовилах из пенопласта. Чаще всего приходится ловить на 5 мелких или средних мушек (крючки № 4—5) на поводках из лески диаметром 0,2—0,25 миллиметра.

Другая оснастка предназначена для крупной рыбы. Она имеет 6 поводков диаметром 0,3 миллиметра и мушки на прочных крючках № 6 или 7. Ориентировочная длина поводков (начиная от кораблика) — 18, 28, 39, 50, 62 и 75 сантиметров.

Мушки можно использовать любые, но лучше начинать ловлю на приманки различной

формы и расцветок, чтобы быстрее найти наиболее привлекательные для рыбы. Большое значение при ловле на кораблик имеет форма и качество крючков.

Ловить рыбу корабликом не так просто, как думают начинающие. Конечно, если удастся попасть на активный клев хариуса, да еще если снасть правильно отрегулирована, приманки хорошо сделаны, то ловить не слишком сложно — рыба сама «цепляется» на крючки. Но это бывает не так часто. Обычно немалых трудов стоит подобрать мушки, которые привлекают рыбу, понять темп проводки, необходимый сегодня. Корабликом ловят, медленно перемещаясь по берегу вверх или вниз по течению и задерживаясь там, где были поклевки или заметно присутствие рыбы. Леску обычно держат натянутой, так что мушки бегут по поверхности воды. Хорошие приманки при правильно подобранной длине поводков даже на совершенно ровном течении чуть дрожат, играют. Но вот рыболов замечает, что всплески рыбы есть, а мушки она не берет. Возможно, рыба сейчас кормится не с поверхности, а под поверхностью воды — мушки в этом случае тоже нужно чуть заглубить. Если, например, пойти по берегу вниз чуть медленнее, чем скорость течения, кораблик создаст заметно меньшую тягу. Натяжение основного шнура уменьшается, и приманки вместе с нижней частью поводков погружаются в воду. Для такого способа ловли можно использовать и утяжеленные мушки.

Хорош и такой прием: опустить мотовило со шнуром к воде и ослабить его натяжение, не

перемещаясь по берегу. Мушки тонут и начинают сплывать по течению. Шнур постепенно натягивается, и приманки медленно выходят из воды. Поклевки при этом наиболее вероятны в момент их погружения и всплытия.

Хватка рыбы при ловле на кораблик бывает заметна по всплеску, реже — рыба выскакивает из воды; поклевку на погруженные в воду мушки заметить труднее. Если рыба «села» на крючок, ощущается потяжка лески — только тогда нужно вытаскивать снасть. Бывает, что рыба раз за разом выходит на мушки, но берет неуверенно, часто промахивается. Иногда это происходит из-за чрезмерно быстрого движения снасти, крупных, грубо сделанных или неподходящих по цвету приманок.

После очередного всплеска промахнувшейся рыбы можно ослабить леску — мушки начинают тонуть, и такое «сбитое» в воду насекомое хватается без опасений.

Если рыба засеклась на крючке, нужно наклониться и опустить всю оснастку в воду. Вытаскивать шнур следует аккуратно, зажимая его между пальцами и не поднимая из воды. Необходимо быть готовым отпустить шнур при резком рывке рыбы, чтобы не дать ей оторвать поводок. Вытащить на кораблик хотя бы килограммовую рыбу трудно — нет ни катушки, ни удилища, амортизирующих рывки добычи.

При выбирании снасти нужно аккуратно раскладывать поводки с мушками на берегу подальше один от другого, иначе потом придется затратить много времени на распутывание лески.

Мормышка. Эта распространенная приманка известна на Северо-Востоке, возможно, не одну сотню лет. Ведь так называемые орочанки и чукотские блесны — тоже разновидности крупных мормышек.

Еще в начале тридцатых годов известный ученый Сергей Владимирович Обручев встречал и на Колыме, и на Чукотке местных жителей, занимавшихся подледным блеснением.

Основные типы применяемых у нас мормышек показаны на рис. 16, *а—в*. Приманки эти, как правило, довольно крупные — длиной от 1,5 до 4 сантиметров и весом 1—5 граммов. При ловле на быстром течении иногда используют и более крупные мормышки-орочанки — до 6—7 сантиметров длиной. Мормышки отливают из олова, свинцовых сплавов или вытачивают из меди, латуни. Наиболее распространенная форма — конусная или каплевидная, крючок — один.

Мормышки с двойным крючком хороши для подледного лова гольцов и хариусов на шитика — личинку ручейника. Вертикально подвешенные мормышки с небольшим тройником (так называемый чертик) у нас неизвестны, хотя московские рыболовы давно и с успехом применяют их для подледной ловли как мирных, так и хищных рыб. На самую мелкую из таких приманок с тройником № 2,5, поставленную на поплавочную удочку вместо крючка (насадка — опарыш или личинка ручейника), я удачно ловил в ручьях карликовую мальму. Более крупная (весом 1—2 грамма) и окрашенная в розовый цвет мормышка с тройником № 4 «пришлась по вкусу» реч-

ным и озерным хариусам. Ловить на эту приманку мне приходилось и подо льдом, и по открытой воде — на длинное удилище с поплавком.

Чукотские блесны — нечто среднее между мормышкой и отвесной блесной. Приманку, изображенную на рис. 13, *е*, используют для подледной ловли гольцов в реках ледовитоморского побережья. Эта блесна имеет длину без крючка 25—30 миллиметров. Делают ее из меди или латуни. Одинарный прочный крючок № 8,5—10 украшен цветными нитками, в основном красного цвета. Способ лова — короткий размах, как при блеснении, и мелкое подергивание в паузах. Следующую приманку (рис. 16, *ж*) мне приходилось видеть у местных рыболовов в верховьях Анадыря: делают ее также из меди или латуни. На крючке (иногда он самодельный, без бородки) закрепляют одну-две узкие полоски белой рыбьей кожи (обычно от кеты-сненки или хариуса). Такая приманка прочно держится и служит весь сезон. Блесну на длинном удилище с прочной короткой леской забрасывают в яму или на струю под перекатом (иногда приходится ловить взабродку) и толчками ведут к берегу. Этот способ очень напоминает ловлю на утяжеленную мушку. В сильно закоряженных местах чукотскую блесну можно опускать в прогалины между бревнами и водить по вертикали.

Легкие блесенки (рис. 16, *з*, *и*) применяются при ловле в проводку или ходовой донкой в основном с наживкой. За последние годы эта приманка заметно распространилась среди рыболовов, и в определенное время (особенно весной и осенью) показывает высокую уловистость.

В период массового ската молоди лососей хищники попадаются на такую блесенку и без наживки.

Отвесное блеснение. Этим способом у нас ловят различных хищных рыб, в основном подо льдом. Легкую снасть с кивком и тонкой леской (блесны с одинарным впаянным крючком) используют преимущественно на Чукотке — для зубатой корюшки, а также в некоторых озерах — для некрупного гольца. Для ловли кунджи, больших гольцов и щуки нужно жесткое удилище с прочной леской, выдерживающей на разрыв не менее 6—8 килограммов. Сторожок (кивок) применять не обязательно — поклевка крупной рыбы хорошо чувствуется рукой. Как правило, в качестве ныряющих блесен у нас применяют крупные или средней величины колеблющиеся спиннинговые приманки, можно применять и самодельные, а также с подвесным крючком. Наилучшие результаты, по моим наблюдениям, дают продолговатые (соотношение длины к ширине около 4) симметричных очертаний блесны, например, «Играющая», «Атом» и подобные им. Наиболее универсальная расцветка — матово-серебристая (белая) или бело-желтая. Вместо тройника лучше подвешивать за заводное кольцо блесны двойной крючок — на 1—2 номера крупнее. Например, на блесну «Играющая» вместо тройника № 10 я ставлю более мощный двойник № 12 с длинным цевьем. Угол между крючками двойника необходимо уменьшить со 120 до 90 градусов, устанавливать его на блесну

лучше крючками к ее вогнутой стороне. На течении такая приманка всегда ложится на дно крючками кверху, что снижает количество зацепов.

Число пустых поклевок и сходов при ловле на двойной крючок (по сравнению с тройником) заметно ниже, так как длинное цевье способствует уверенной подсечке. Крючки блесен желательно маскировать яркими перышками, нитками или полосками мягкого пластика.

В больших озерах обычно ловят вблизи берегов или на отмелях — на глубине от 2 до 5 метров, редко глубже. Не нужно сразу стремиться опустить приманку до дна, лучше сначала обловить верхние слои воды — 1—2 метра подо льдом. Затем можно опускать блесну глубже, делая по 5—10 взмахов (с паузами по 3—5 секунд) на каждые 1—1,5 метра разматываемой лески. Для этой ловли хороши блесны, при погружении далеко уходящие в сторону: они позволяют облавливать значительные пространства вокруг каждой лунки.

В мае — июне, когда уже тепло, удобно использовать удочку с катушкой: на стопор ее ставить не нужно, достаточно просто придерживать барабан рукой.

Размотав не более двух метров лески, я опускаю блесну под лед, делаю несколько взмахов, затем отпускаю барабан катушки. Нужное количество лески уходит под лед, блесна при этом отклоняется далеко в сторону от лунки и, играя, возвращается в вертикальное положение, но уже на большей глубине.

Примерно так же можно ловить и на реках, используя течение. Обычно я опускаю блесну почти до дна, делаю несколько взмахов с паузами. Течение начинает сносить приманку, вскоре она поднимается ближе ко льду. Тогда я выпускаю с катушки столько лески, чтобы блесна легла на дно (на несколько метров ниже по течению), чуть отрываю ее ото дна и вновь начинаю блеснить. Используя приманку подходящего веса, мне удавалось на среднем течении при глубине 1—2 метра выпускать до 6—7 метров лески. Такой способ очень результативен и позволяет через одну лунку облавливать значительное пространство.

Хороший способ отвесного блеснения — объединение в одной снасти блесны и мормышки. Подобную оснастку используют на Чукотке, а также в Скандинавских странах. Например, вместо двойного или тройного крючка обычной ныряющей блесны можно привязать прочный поводок длиной от 5 до 15 сантиметров с мормышкой или совсем мелкой блесенкой длиной 15—20 миллиметров и небольшого веса. Длина поводка тем больше, чем ниже скорость течения, и самые длинные используют при ловле на озерах. На крючок мормышки или блесенки насаживают естественную приманку (личинку ручейника, лососевую икру или рыбий глаз), а при хорошем клеве достаточно использовать кусочек яркой поролоновой губки.

Другой вариант этой снасти: одинарный крючок или мормышку ставят на поводке выше блесны.

Отвесным блеснением можно ловить очень

крупных рыб. Мне удавалось вытаскивать кунджу весом до 5 килограммов, а озерного гольца — до 6,5 килограмма. Такую рыбу не удается протащить через стандартную лунку — необходим ледобур увеличенного диаметра или пешня.

Рыбы — прекрасные индикаторы негативных процессов, происходящих в водоемах. Например, если в реке много хариуса, можно утверждать, что с качеством воды здесь все в порядке, и интенсивность вылова не чрезмерна. К сожалению, разрушение природы в Магаданской области, как и в других районах Севера, идет очень быстрыми темпами. Теперь уже никто всерьез не говорит о неисчерпаемости рыбных богатств Дальнего Востока: если мы не изменим своего отношения к природе, их можно «исчерпать» уже к началу следующего тысячелетия. Причин этому немало: и недостаточный уровень развития техники, и отсутствие экономической заинтересованности в использовании ресурсосберегающих технологий, но прежде всего невысокий уровень экологической культуры населения. Ведь как-то «само собой» получается, что практически везде, где появляются люди, возникает та или иная разновидность помойки или свалки: если не искореженная земля с россыпями ржавых бочек, то консервные банки и кострища...

Занятие спортивным и любительским рыболовством — прекрасный вид отдыха. Конечно, привлекает и возможность добыть для семьи свежей рыбы. Но для многих рыболовов не это самое главное — им важен сам «процесс».

Правда, кое-кого на водоеме просто обуревает жадность: наловить побольше и любой ценой. Такие «рыболовы», если рыба не клюет, без тени сомнения будут ловить сетью или на подсечку, или даже травить хлоркой.

Еще не все поняли, что для истинного любителя самое важное — как поймать рыбу, а размер улова тут ни при чем. Ведь почувствовать одну-две поклевки хорошей рыбы за день лова гораздо приятнее, чем «надергать» кучу мелочи. Точно так же намного спортивнее и интереснее ловить на красивую и изящную снасть с одним крючком, а не на многокрючковые самоловы и самодуры. Именно по этой причине многие опытные рыболовы искусственные приманки предпочитают натуральным насадкам. Найти и перехитрить «штучную» рыбу — вот к чему стремится настоящий рыболов-спортсмен.

Если имеющиеся в этой книге сведения помогут читателю лучше узнать и понять рыб, освоить непростое искусство спортивной рыбной ловли — можно считать, что автор отчасти выполнил свою задачу.



Рис. 9. Плавник аляскинского хариуса



Рис. 10. Сиг-востряк (вверху), сиг-горбун, или пыжьян



Рис. 11. Вращающиеся блесны: *а—д* — основные типы лепестков; *е* — подвески для лепестков; *ж*, *з* — варианты оснастки легких блесен; *и* — блесна с подгрузком; *к* — коромысло для камчатской оснастки



Рис. 12. Варианты оснастки поплавочной удочки: *а* — грузило и крючок; *б* — грузило и два крючка; *в* — мормышка и крючок; *г* — грузило и легкая блесенка; *д* — грузило, крючок и искусственная мушка



Рис. 13. Уловистые в наших условиях типы легких мушек



Рис. 14. Утяжеленные мушки: *а* — на двойном крючке; *б*, *в* — на одинарных крючках; *г* — трубчатая мушка



Рис. 15. Основные узлы: *а* — привязывание крючка; *б* — затяжной узел; *в* — получение торчащей вбок петли; *г*, *д* — привязывание мормышек; *е* — вариант оснастки с помощью узла *д*



Рис. 16. Мормышки: *а* — свинцовая, *б* — точеная из меди, *в* — паяная из проволоки, *г* — свинцовая с двойным крючком, *д* — с тройником. Чукотские блесны: *е* — для подледной ловли гольца (Чаун), *ж* — летне-осенняя хариусовая. Легкие блесенки: *з*, *и*

Приложение 1

Основные характеристики уловистых вращающихся блесен для ловли некоторых рыб

Виды рыб	Лепесток				Тройник		
	длина, мм	ширина, мм	цвет	блеск	скорость вращения	размах	номер тройника
Чавыча	40—55	25—35	белый, желтый	яркий	малая	средний, малый	15—17
Кижуч	30—40	15—20	белый	»	средняя	средний	10—12
Кунджа	25—40	10—20	»	матовый	»	малый	10—12
Мальма, Микижа	20—30	10—15	»	яркий	большая	средний	8,5—10

Виды рыб	Лепесток				Тройник		
	длина, мм	ширина, мм	цвет	блеск	скорость вращения	размах	номер тройника
Щука	30—45	15—20	белый, желтый	матовый	любая	средний, малый	10—12
Хариус	25—35	10—12	красный (медный), желтый с черными полосами	»	малая	мини-мальный	8,5—10

Приложение 2

Современные капроновые или нейлоновые лески имеют массу достоинств, но необходимо помнить, что они очень чувствительны к узлам. Неправильно завязанный узел снижает прочность снасти в 1,5—3 раза! Совершенно необязательно знать десятки узлов, но некоторые из них просто необходимы — без них нельзя грамотно построить снасть (рис. 15):

а) этот узел более надежен. Крючки обычно привязывают «восьмеркой». Необходимо помнить, что при привязывании крючка с колечком достаточно обмотать его цевье трижды, а если с лопаточкой — 4—5 раз;

б) затяжной узел выполняется подобно первому, но не на цевье крючка, а на самой леске, так что образуется затяжная петля. Используется для привязывания искусственных мушек, летних и зимних блесен, грузил, поводков (за петлю основной лески), при закреплении лески на шпуле безынерционной катушки и т. д.;

в) этот узел используют во всех случаях, когда от основной лески должны отходить боковые поводки: лов на ходовую донку, закидушку, искусственные мушки, самодур для корюшки. При этом на основной леске образуется торчащая вбок петля, за которую затяжным узлом крепятся поводки;

г) при привязывании мормышки проще все-

го продеть леску в ее отверстие и завязать затяжным узлом за цевье крючка;

д) можно также 2—3 раза продеть леску в отверстие мормышки, затем ходовым концом лески завязать простой узел, захватывающий продетые через мормышку петли лески, и затянуть;

е) на свисающий ниже мормышки свободный конец лески можно привязать дополнительный крючок, мормышку или легкую блесенку.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Часть 1. Рыбы Северо-Востока 6
Часть 2. Снасти и способы лова 69
Заключение 103
Приложение 1 105
Приложение 2 107

На 1-й странице обложки:
кижуч в брачном наряде;

На 4-й странице обложки:
микижа

СКОПЕЦ Михаил Борисович

СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СССР

Художественный редактор
В. А. Галимуллин

Технический редактор
Н. С. Ганцева

Корректоры
В. И. Огрызко,
Л. В. Иванова

ИБ № 1011

Сдано в набор 27.07.90. Подписано к печати 29.11.90. Формат 70×90/32. Бумага тип. № 1 + мелованная (вкл.). Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,14+0,59 вкл. Усл. кр.-отт. 5,28. Уч.-изд. л. 4,22. Тираж 20 000 экз. Заказ 676. Цена 35 к.

Магаданское книжное издательство, 685000, Магадан, пр. Ленина, 2.

Издательство Магаданского обкома КПСС, 685000, Магадан, пл. Горького, 9.

Скопец М. Б.

С44 Спортивное рыболовство на Северо-Востоке СССР.— Магадан: Кн. изд-во, 1990.— 107 с.: ил.

ISBN 5—7581—0106—0

Автор, ихтиолог по специальности, научный сотрудник Института биологических проблем Севера, попытался отразить в своей книге своеобразие образа жизни обитающих на Северо-Востоке СССР пресноводных рыб, рассказать о некоторых приемах и тонкостях их лова. Большое внимание уделено правилам спортивного и любительского рыболовства.

С $\frac{4002020000—038}{М—149(03)—90}$ 25—90 **ББК 47.2**

В 1991 году
Магаданское
книжное издательство выпускает
в свет книгу Л. И. Сташкевича
«АРКТИЧЕСКАЯ ЗАПОВЕДЬ».

В популярной форме автор
рассказывает в ней о заповедном
острове Врангеля — жемчужине
Крайнего Северо-Востока.



Голец Таранца (серебрянка и в брачном наряде)